




биовитекс



БИОСТИМ

каталог
ветеринарных препаратов



*В Вашей работе
для нас нет мелочей!*

СОДЕРЖАНИЕ

Амоксистим 15 %	4
Амоксистим 50 %	6
Антисептик-Стимулятор Д-2 фракция раствор	8
Антисептик-Стимулятор Д-2 фракция 15% раствор для животноводства	10
Антисептик-Стимулятор Д-2 фракция 15% раствор для птицеводства	12
Антисептик-Стимулятор Д-3 Аэрозоль для свиноводства	14
Антисептик-Стимулятор Д-3 Аэрозоль для КРС	16
Антисептик-Стимулятор Д-3 Фракция раствор	18
Бизопрол	20
Бизопрол гель	22
Бромостим-50	24
Геостим NEW	26
Глефостим NEW	28
Гуси ЛИВ-22	30
Доксистим 10%	32
Йод однохлористый	34
Йодинокс	36
Йодостим шашка	38
Колистим 6М	40
Колистим 6М ОР	42
Крысоед	44
Мухобой	46
Оксистим 20%	48
Раствор йода 5% спиртового – И	50
Редукция	52
Редукция-С NEW	54
Рыбий жир	56
Тилмостим 25%	58
Трисульфастим	60
Ферростим-200	62
Флористим 10%	64
Ципростим	66
Эйместат 2,5%	68
Эйместат 5%	70
Энроколистим	72
Энростим 5%	75
Энростим 10%	77
Сопутствующие товары	79
Хорнистим	81
Лубристим	83
Кормовые антибиотики NEW	85

При использовании ветеринарных препаратов пользуйтесь утвержденной «Инструкцией по применению»



АМОКСИСТИМ 15%

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ



ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
•
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ С ПЕРВОЙ ИНЪЕКЦИИ
•
ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ
•
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

АМОКСИСТИМ 15%

Амоксициллина тригидрат – 150 мг/мл



АМОКСИСТИМ 15% - антибактериальный лекарственный препарат из группы пенициллинов. Амоксициллин, входящий в состав АМОКСИСТИМ 15%, является полусинтетическим антибиотиком пенициллинового ряда и обладает широким спектром антимикробного действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Campylobacter*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Streptococcus spp.*

Применение:

АМОКСИСТИМ 15% назначают для лечения крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек при инфекционных болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы и кожных покровов, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

АМОКСИСТИМ 15% применяют крупному и мелкому рогатому скоту, овцам и свиньям однократно внутримышечно или подкожно, а собакам и кошкам – подкожно, в дозе 1 мл на 10 кг живой массы. При необходимости курс лечения крупному рогатому скоту и свиньям может составлять 3-5 инъекций с интервалом 48 часов, собакам и кошкам – 24 часа. Максимальный объем суспензии для введения в одно место не должен превышать:

- для крупного рогатого скота – 20 мл, мелкого рогатого скота – 4 мл;
- для свиней – 5 мл;
- для собак – 2,5 мл, кошек – 1 мл.

Перед применением флакон с лекарственным препаратом необходимо тщательно встряхнуть. После введения лекарственного препарата место инъекции следует помассировать.

Противопоказанием для применения препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к антибиотикам пенициллинового ряда и другим компонентам препарата.

Ограничения:

Использование мяса животных в пищу людям разрешается через 28 суток после последнего применения препарата.

Молоко, полученное от коров в период применения и в течение 96 часов после последнего введения лекарственного препарата, запрещается использовать для пищевых целей.

Фасовка:

Расфасован в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками по 10, 20, 50, 100 и 250 мл

Условия хранения:

В закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C. Следует хранить в местах, недоступных для детей.



АМОКСИСТИМ 50%

ПОРОШОК ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ОСОБО ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ОПАСНЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПАТОГЕНОВ

•

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МЕСТНЫХ И СИСТЕМНЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

АМОКСИСТИМ 50%

Амоксициллина тригидрат – 500 мг/г

Для лечения свиней, телят и сельскохозяйственной птицы при болезнях бактериальной этиологии. Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Acinetobacter spp.*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Leptospira sp.*



Применение:

АМОКСИСТИМ 50% применяют свиньям с питьевой водой в течение 5-7 дней и телятам перорально с питьевой водой или заменителем молока в суточной дозе 20-40 мг/кг живой массы (соответствует 10-20 мг/кг амоксициллина по активному веществу)

Птицам АМОКСИСТИМ 50% дают перорально с питьевой водой, рассчитывая необходимое количество препарата по следующей формуле:

$$m = \frac{0,04 \times M_{\text{птиц}}}{V_{\text{воды}}}, \text{ где}$$

0,04 – доза АМОКСИСТИМа 50% (г/кг),

m – Количество АМОКСИСТИМа 50% (г/л),

M – общая живая масса обрабатываемого поголовья птиц (кг),

V – общее суточное потребление воды поголовьем (л).



Препарат применяют в течение 3-5 дней.

Ограничения:

Использование мяса КРС в пищу людям разрешается не ранее чем через 15 суток, свиней не ранее, чем через 8 суток, птицы не ранее, чем через 3 суток после последнего применения АМОКСИСТИМа 50%.

При лечении животных не следует применять АМОКСИСТИМ 50% одновременно с тиамфениколом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, цифалоспорином и фторхинолонами, а также препаратами, содержащими карбоксиметилцеллюлозу.

Фасовка:

-Выпускают расфасованным:

- по 100, 500 и 1000 г., в пластиковые банки;
- по 100, 500, 1000 и 5000 г. в многослойные пакеты из полиэтилена, алюминиевой фольги и бумаги;
- по 10 и 20 кг. В многослойные мешки из полиэтилена и бумаги.

Условия хранения:

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от +2°C до +25°C.

При соблюдении условий хранения, срок годности - 3 года с даты производства.



АНТИСЕПТИК

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПАТОГЕНОВ

- возбудителей бактериальных, вирусных заболеваний, раневых гнойных инфекций
- кокцидиоза
- не вызывает устойчивости микроорганизмов

СТИМУЛЯТОР

- стимулирует формирование гуморального и клеточного иммунитета
- повышает уровень неспецифической защиты
- стимулирует моторную деятельность желудочно-кишечного тракта
- стимулирует деятельность ЦНС
- стимулирует рост и развитие животных и птицы

ПРИМЕНЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ:

- желудочно-кишечного тракта
- органов дыхания
- репродуктивных органов
- нервной системы
- кожного покрова
- катаральной пневмонии

ДЕТОКСИКАЦИЯ

УЛУЧШАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКЦИНАЦИЙ

ПОВЫШАЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ

- повышает обмен веществ
- повышает яйценоскость, выводимость

БЕЗ ВЫБРАКОВКИ

В УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФАСОВКЕ

- от 10 мл до 5000 мл.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 фракция



БИОГЕННЫЙ СТИМУЛЯТОР №1

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ

Препарат является продуктом сухой перегонки сырья животного происхождения. Содержит в 1 мл аминокислоты – 2,7 мг, неорганические азотистые соединения, алифатические и циклические углеводороды, меркаптановые соединения и воду – до 1 мл.

Применение:

Раствор для наружного, орального, интравaginaльного и внутриматочного применения. Назначают с лечебно-профилактической целью животным и птице при болезнях желудочно-кишечного тракта: диспепсии различной этиологии, гастроэнтероколитах, гастроэнтеритах, тимпаниях КРС, метеоризме у лошадей; болезнях органов дыхания: катаральной пневмонии, бронхитах и трахеитах; мочеполовой системы: вагинитах, задержании последа у коров, острых и хронических эндометритах, пиометра, трихомонозе, для профилактики овариосальпингитов кур; при поражениях кожных покровов: некробактериозе, экземе, дерматите, трофических язвах, аптериозе; нарушениях обмена веществ: дистрофических состояниях; при инфекционных заболеваниях, для стимуляции деятельности центральной и вегетативной нервной системы, для повышения естественной резистентности, а также для стимуляции роста и развития поросят, цыплят и повышения яйценоскости.

Режим дозирования при оральном применении:

Вид животного	Возраст	Разовая доза лекарственного препарата на голову (мл)	Степень разведения: Препарат /вода или комбикорм
Лошади	От 3 лет и старше	10-20	1/10-30
	От 1 года до 3 лет	10-15	
	До 1 года	5	
Коровы	От 3 лет и старше	20-30	
	От 1 года до 3 лет	10-15	
	До 1 года	5-7	
Овцы	Старше 1 года	2-5	1/10-40
	Старше 6 месяцев	1-3	
	До 6 месяцев	0,5-2	
Свиньи	Старше 1 года	5-10	
	Старше 6 месяцев	2-5	
	2-3 месяца	1-3	
Собаки	От 10 месяцев	2	1/20
Птица:			
Куры, индоки, утки, гуси	Взрослое поголовье	0,04-0,08 мл/голову	
	Молодняк	0,03-0,05 мл/голову	

Инфицированные и медленно заживляющие раны, в том числе гнойные, промывают 15-20%-ным раствором препарата, накладывают повязки и вводят марлевые дренажи, смоченные раствором.

При внутриматочном и интравaginaльном введении, использовать 2-20%-ый водный раствор.

Ограничения:

Мясо, молоко животных и яйцо птицы можно использовать без ограничений.

Фасовка:

Полимерные или стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100, 200 мл; пластиковые бутылки по 250, 500, 1000 мл; пластиковые канистры по 2500, 5000 мл; пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых лучей месте при температуре от 0°C до 25°C.

При соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 4 года с даты производства, после вскрытия флакона – 14 суток.



АНТИСЕПТИК СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР



НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКОГО ЗАПАХА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ

ПОЛНЫЙ РАСХОД В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

ЗНАЧИТЕЛЬНО СТИМУЛИРУЕТ ИММУНИТЕТ БЕЗОПАСЕН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

НЕТ СРОКОВ
КАРЕНЦИИ*

ЭФФЕКТИВЕН И БЕЗОПАСЕН ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЭНДОМЕТРИТАХ

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР относится к стимулирующим, антисептическим и ранозаживляющим лекарственным препаратам наружного действия.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР является рабочим раствором для наружного применения. Входящие в состав лекарственного препарата биологически-активные вещества стимулируют активность иммунной и ретикуло-эндотелиальной системы, нормализуют трофические процессы, обладают противовоспалительным и антибактериальным действием, что ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

Применение:

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР назначают при поражениях как кожи, так и слизистых оболочек органов дыхания, пищеварения и размножения.

Для обработки ран и промывания полостей у крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, а также для профилактики и лечения воспалительных процессов матки.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР применяют наружно для обработки наружных половых органов. Интравагинально и внутриматочно препарат вводят с помощью катетера для искусственного осеменения.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Коровам – 300 мл. на голову	В течение 3 - 4 дней, ежедневно с интервалом 24 часа
Для профилактики послеродовых осложнений коровам	Однократно

СВИНОМАТКИ

Свиноматкам – 300 мл. на голову.	В течение 2 - 3 дней, ежедневно с интервалом 24 часа
Для санации матки у свиней, с профилактической целью	Однократно

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Мелкому рогатому скоту 50-70 мл. на голову.	В течение 3 - 4 дней, ежедневно с интервалом 24 часа
При обработке кожи или слизистой оболочки с целью обеззараживания, а также на свежие раны	В течение 5 - 7 дней, ежедневно 1 - 2 раза в день В зависимости от величины поражения количество раствора должно быть таким, чтобы можно было полностью смочить обрабатываемую поверхность.

Ограничения:

Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных после применения препарата используется в пищевых целях без ограничений.

Фасовка:


Пластиковые, алюминиевые и жестяные моноблочные баллоны, объемом 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мл с насадкой для распыления, содержащие инертный газ под давлением (изобутан и азот до 5,8 бар).

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства.



АНТИСЕПТИК СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР



ПОЛНЫЙ РАСХОД
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ

ПОВЫШАЕТ ВЫВОД ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ

ЗНАЧИТЕЛЬНО СТИМУЛИРУЕТ ИММУНИТЕТ БЕЗОПАСЕН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

УЛУЧШАЕТ СОХРАННОСТЬ И
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ

НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКОГО ЗАПАХА
НЕТ СРОКОВ КАРЕНЦИИ

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР относится к стимулирующим, антисептическим и ранозаживляющим лекарственным препаратам наружного применения.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР является рабочим раствором для наружного применения. Входящие в состав лекарственного препарата биологически-активные вещества стимулируют активность иммунной и ретикуло-эндотелиальной системы, нормализуют трофические процессы, обладают противовоспалительным и антибактериальным действием, что ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

Применение:

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР в аэрозольных баллонах или в баллонах с насадкой для распыления применяют с целью повышения вывода инкубационных яиц птиц и улучшения жизнеспособности молодняка птиц.

для ПТИЦЫ

Инкубационное яйцо	С расстояния 15 - 20 см. с экспозицией 8 - 10 секунд на каждый лоток с яйцом. Двукратно. Первый раз непосредственно перед закладкой, второй раз при переводе на вывод.
Обработка суточного молодняка птиц перед посадкой в клетки или на пол	Непосредственно на птиц с расстояния 15 -20 см. с экспозицией 10 - 15 секунд для каждого ящика с молодняком птиц. Однократно.

Ограничения:

Мясо и яйца птицы после применения препарата используются в пищевых целях без ограничений.

Фасовка:

Пластиковые, алюминиевые и жестяные моноблочные баллоны, объемом 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мл с насадкой для распыления, содержащие инертный газ под давлением (изобутан и азот до 5,8 бар).

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в герметичной упаковке – 3 года со дня производства.

АНТИСЕПТИК СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ

АЭРОЗОЛЬ



ЭФФЕКТИВЕН

- В БОРЬБЕ С КАННИБАЛИЗМОМ
- ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ КАСТРАЦИИ

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ – аэрозоль для наружного применения.

Является продуктом сухой перегонки тканей животного происхождения и содержит в своем составе карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы и замещенные фенолы, аминокислоты, алифатические амины и амиды, соединения с активной сульфгидрильной группой, воду и газ-вытеснитель пропан бутан. Лекарственный препарат стимулирует активность ретикуло-эндотелиальной системы, нормализует трофические процессы и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием. Также обладает репеллентными свойствами, эффективно отпугивает насекомых и обладает запахом, останавливающим свиней и птиц от каннибализма.

Применение:

Назначают с лечебно-профилактической целью животным для лечения инфицированных вялозаживающих ран, в комплексной терапии стафилококковых дерматитов у свиней, хронических воспалительных поражений кожи и мягких тканей, копытцев, трофических язв, свищей, а также в комплексной терапии некробактериоза.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ в виде аэрозоля применяют наружно, распыляя на расстоянии 15-20 см непосредственно на поврежденную поверхность кожи или конечностей, один раз в сутки.

При заболеваниях кожи и копыт – один раз в сутки до выздоровления. При некробактериозе крупного рогатого скота и копытной гнили овец – один раз в сутки после санитарной обработки пораженных участков конечностей. При каннибализме свиней и расклеве птиц – один раз в сутки непосредственно на поврежденную поверхность кожи. При кастрации и купировании хвостов у поросят, телят, ягнят, жеребят, кошек и собак, мечении выщипами, бирковании, а также купировании ушей препарат наносят на рану сразу после операции однократно, при необходимости обработку повторяют через 72 часа. Для отпугивания насекомых препарат наносят на наиболее уязвимые участки тела животного либо на поврежденные кожные покровы. Для отпугивания грызунов обрабатывают поверхность.

Ограничения:

Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных после применения препарата используется в пищевых целях без ограничений.

Фасовка:

Пластиковые, алюминиевые и жестяные моноблочные баллоны с инертным газом под давлением по 100, 150, 200, 250, 300, 500 мл с насадкой для распыления.

Условия хранения:

Хранение в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°C до 30°C.

Срок годности – 4 года с даты производства.

АНТИСЕПТИК СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ

АЭРОЗОЛЬ



- обезроживание
- дерматиты
- экземы
- трофические язвы
- свищи

- различные поражения кожных покровов
- обработка пуповины при рождении
- при кастрации открытым способом

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ – аэрозоль для наружного применения. Является продуктом сухой перегонки тканей животного происхождения и содержит в своем составе карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы и замещенные фенолы, аминокислоты, алифатические амины и амиды, соединения с активной сульфгидрильной группой, воду и газ-вытеснитель пропан бутан. Лекарственный препарат стимулирует активность ретикуло-эндотелиальной системы, нормализует трофические процессы и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием. Также обладает репеллентными свойствами, эффективно отпугивает насекомых и обладает запахом, останавливающим свиней и птиц от каннибализма.

Применение:

Назначают с лечебно-профилактической целью животным для лечения инфицированных вялозаживающих ран, в комплексной терапии стафилококковых дерматитов у свиней, хронических воспалительных повреждений кожи, копыт, трофических язв, свищей, некробактериоза, гинекологических заболеваний различной этиологии.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ в виде аэрозоля применяют наружно, распыляя на расстоянии 15-20 см непосредственно на поврежденную поверхность кожи или конечностей, один раз в сутки.

При заболеваниях кожи и копыт – один раз в сутки до выздоровления. При некробактериозе у крупного рогатого скота и копытной гнили у овец – один раз в сутки после санитарной обработки пораженных участков конечностей. При каннибализме свиней и расклеве птиц – один раз в сутки непосредственно на поврежденную поверхность кожи. При кастрации и купировании хвостов у поросят, телят, ягнят, жеребят, МДЖ, мечении выщипами, бирковании, купировании ушей препарат наносят на рану сразу после операции однократно, при необходимости обработку повторяют через 72 часа. Для отпугивания насекомых препарат наносят на наиболее уязвимые участки тела животного либо на поврежденные кожные покровы.

Ограничения:

Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных после применения препарата используется в пищевых целях без ограничений.

Фасовка:

Пластиковые, алюминиевые и жестяные моноблочные баллоны с инертным газом под давлением по 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мл с насадкой для распыления.

Условия хранения:

Хранение в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°C до 30°C. Срок годности 4 года со дня производства.



АНТИСЕПТИК - СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

инфицированных вялозаживающих ран;

дерматитов;

хронических воспалительных поражений
кожи и копыт;

трофических язв, свищей;

копытной гнили овец;

некробактериоза;



Более 70 лет успешного применения в ветеринарии

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ – раствор для наружного применения. Уникальный биогенный стимулятор с широким спектром лечебных и профилактических свойств. АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 ФРАКЦИЯ является продуктом сухой перегонки тканей животного происхождения, содержит в своем составе воду, карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, алкилбензолы и замещенные фенолы, аминокислоты, алифатические амины и амиды, а также соединения с активной сульфгидрильной группой.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой густую жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Биологически активные вещества, входящие в состав препарата, оказывают антисептическое и противовоспалительное действие, стимулируют активность ретикулоэндотелиальной системы, нормализуют трофические процессы и ускоряют регенерацию поврежденных тканей, а также обладают репеллентными свойствами.

Применение:

Препарат назначают для лечения инфицированных язв заживающих ран, дерматитов, хронических воспалительных повреждений кожи и копыт, трофических язв, свищей, поражений копыт при некробактериозе, а также при каннибализме свиней и птиц.

Препарат применяют при заболеваниях кожи и копыт – наружно в нативном виде или в форме масляных растворов и мазей. Масляные растворы препарата готовят в асептических условиях с использованием касторового, льняного, подсолнечного и минерального масел, в которые при тщательном перемешивании добавляют АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракцию в соотношении 1:1 – при тяжелой степени заболевания или 1:5 – при средней и легкой степени заболевания.

- При лечении инфицированных язв заживающих ран и свищей, проводят санитарную обработку пораженного участка до полного удаления гнойного экссудата, только после этого обрабатывают лекарственным препаратом. Обработку проводят ежедневно до выздоровления животного.
- При экземах, пролежнях, дерматитах, хронических воспалительных поражениях кожи, пиодермии и трофических язвах на пораженные участки кожи наносят наружно 20-50% масляные растворы препарата один раз в сутки.
- При заболеваниях кожи и копыт – наружно в форме масляных растворов и мазей.
- При некробактериозе крупного рогатого скота и копытной гнили овец после санитарной обработки пораженных участков конечностей их смазывают препаратом один раз в день.
- При вагинитах, эндометритах, пиометре, вызванных трихомонозом или патогенной микрофлорой рекомендуется вводить 20% масляный раствор при помощи шприца ЖАНЕ с катетером во влагалище, марлевые тампоны, пропитанные раствором.

Ограничения:

Препарат совместим с различными группами лекарственных препаратов. Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных и яйцо птицы после применения препарата используются в пищевых целях без ограничений.

Фасовка:

Стеклоянные флаконы по 100 мл, полимерные бутылки по 1 л.

Условия хранения:

Хранение в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°C до 30°C. Срок годности 4 года со дня производства.

БИЗОПРОЛ

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ



Широкий спектр антимикробного действия

Быстрое и удобное нанесение

Короткое время экспозиции

Экономичный расход

Не требует смывания с поверхности

Хорошо переносится кожей

**Относится к 4 классу
малотоксичных веществ**

**Не содержит альдегидов, хлора,
фенолов, ароматизаторов**

**Не оказывает отдалённых последствий
(эмбриотоксического, мутагенного, тератогенного и гонадотропного)**

БИЗОПРОЛ

Изопропиловый спирт 70%

Бизопрол – водный раствор изопропилового спирта 70% в форме аэрозоля для наружного применения.

В состав входит изопропиловый спирт 70%, вода, газ-вытеснитель.

Назначают в качестве дезинфицирующего средства для рук, кожи перед инъекциями, для обработки ветеринарного и зоотехнического инвентаря, обуви, поверхности и прочего на с/х предприятиях и в быту.

Распыляется на обрабатываемую поверхность. Не требует растирания и смывания. Рекомендуемое время экспозиции перед манипуляциями от 15-ти до 30-ти секунд (дезинфекция рук, поверхностей, инструментария – 30 секунд; хирургического поля и перед хирургическими манипуляциями – 15 секунд).

Средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной (включая вирус гриппа, в том числе гриппа H1N1 и H5N1) и фунгицидной активностью в отношении грибов рода *Candida* и дерматофитов.

Применение:

Ветеринарные и животноводческие объекты, инфекционные очаги, бактериологические и вирусологические лаборатории, клинические учреждения и лаборатории, акушерские стационары, в быту для обработки любых поверхностей, на транспорте для обработки поручней, дезинфекция труднодоступных поверхностей, ветеринарные клиники, грумминг-центры, предприятия фармацевтической промышленности, предприятия продовольственной торговли, санитарный транспорт, ветеринарная логистика, спортивные и культурно-оздоровительные комплексы. По параметрам острой токсичности средство Бизопрол при попадании в желудок и нанесении на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных веществ. По степени ингаляционной опасности, в рекомендованных режимах применения, средство относится к 4 классу малоопасных веществ.



Меры предосторожности:

Огнеопасно. Не распылять вблизи открытых источников огня. Избегать попадания дезинфектанта на слизистые оболочки глаз. Обработку производить в хорошо проветриваемых помещениях и открытых площадках.

Фасовка:

Флакон по 150, 300, 500 мл.

Условия хранения:

В недоступном для детей месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от -5°C до 25°C. Срок хранения 3 года с даты производства.

БИЗОПРОЛ ГЕЛЬ



АНТИСЕПТИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК

•
НЕ СУШИТ КОЖУ

•
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РУКАМ

БИЗОПРОЛ-ГЕЛЬ

БИЗОПРОЛ-ГЕЛЬ – бесцветная жидкость в виде геля с запахом изопропилового спирта и применяемой отдушки. В состав входит: хлоргексидин 0,2%, изопропиловый спирт 50% по объёму, вода, функциональные компоненты, Flocare PSD 1037 и отдушка Lemon Verbena.

Гель для дезинфекции рук и санитарной обработки поверхностей: салонов общественного транспорта, ручек дверей и т.д. Бережно относится к коже, не пересушивая её.

БИЗОПРОЛ-ГЕЛЬ обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении большинства неспорообразующих микроорганизмов, бактерий и вирусов.

Применение:

Для дезинфекции рук небольшое количество препарата нанести на кожу рук и втирать до высыхания не менее 15 секунд.

Для дезинфекции автотранспорта по мере необходимости (во время эпидемии) нанести препарат на требуемые поверхности.

Для обработки дверных ручек нанести препарат на салфетку и протереть дверные ручки.

Фасовка:

В пластмассовом флаконе с распылителем по 100 мл.

Условия хранения:

В недоступном для детей месте, защищённом от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности 3 года со дня изготовления.



БРОМОСТИМ-50

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

•

ХОРОШО РАСТВОРИМ В ВОДЕ

БРОМОСТИМ-50

Дидецилдиметиламмоний бромид – 50%

Бромостим-50 – дезинфицирующее средство из группы катионных поверхностно-активных веществ.

По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость со слабо выраженным запахом изопропилового спирта. Бромостим-50 обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении широкого спектра неспорообразующих микроорганизмов. Средство растворимо в воде.

Препарат применяют с целью общей санобработки и дезинфекции, обработки животноводческих помещений и инвентаря.

Применение:

Бромостим-50 применяют для профилактической дезинфекции: помещений для содержания птицы, помещений и оборудования цехов убоя птицы, инкубаториев, яичной и мясной тары, помещений и оборудования на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности, санитарно-убойных пунктах животноводческих хозяйств, убойных пунктах в звероводческих хозяйствах; животноводческих помещений, находящегося в них оборудования, инвентаря, предметов ухода за животными; автомобильного транспорта и других транспортных средств, используемых для перевозки мяса, мясопродуктов и сырья животного происхождения; помещений для содержания животных и инвентаря в питомниках, цирках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках.

Для вынужденной дезинфекции названных объектов при болезнях бактериальной этиологии и некоторых вирусных инфекциях, при которых качество дезинфекции контролируют по выделению кишечной палочки и стафилококков.

При расчете концентрации рабочих растворов препарат принимают за 100% вещество.

Дезинфекцию проводят в отсутствии животных (птиц), продуктов убоя, сырья и готовой продукции.

Меры предосторожности:

В рекомендуемых для применения концентрациях препарат не раздражает кожу и слизистые оболочки, не вызывает коррозии металлов, обладает моющими свойствами.

Рабочие растворы (0,5-4%) при повторных воздействиях вызывают слабое раздражение кожи.

Ингаляционным воздействием рабочие растворы в форме аэрозоля (при орошении) вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и органов дыхания; в форме паров рабочие растворы не вызывают этого эффекта.

Все виды работ с Бромостим-50 проводят с использованием средств индивидуальной защиты.

Фасовка:

В полиэтиленовые бутылки по 1 л и 5 л, снабженные герметичной контрольной крышкой.

Условия хранения:

Хранят препарат в закрытой заводской упаковке в сухих помещениях вдали от нагревательных приборов и открытого огня, в защищенном от света, недоступном для посторонних лиц и животных месте при температуре от -25°C до +25°C.

Срок годности препарата 3 года со дня изготовления при соблюдении правил хранения.

Срок годности рабочих растворов – 7 суток.



ГЕОСТИМ



ГЕОСТИМ

дезинфицирующее средство в форме раствора, предназначена для дезинфекции прилегающей территории и объектов ветнадзора. Представляет собой жидкость синего цвета, имеющую специфический запах, смешивается с водой в любых соотношениях. Обработка производится в отсутствии животных.

Состав:

Активные вещества: Альгиды (Aldehydes):

1. Глутаровый альдегид 70,0 gm/l

2. Формальдегид 50 gm/l

3. Сульфат меди 80 gm/l

Вспомогательное вещество: Муравьиная кислота 20 gm/l

Механизм действия заключается в нарушении окислительно-восстановительных процессов в микробной клетке, путём вступления в реакцию с аминогруппами белков микроорганизмов.

Применение:

Рабочие растворы средства «Геохим» готовят путем разведения определенного количества концентрата в воде и перемешивания, при этом сначала в емкость наливают воду, а затем добавляют концентрат:

Требуемая концентрация (по препарату), %	Количество средства и воды, необходимое для приготовления 10 литров рабочего раствора.	
	Средство, гр	Вода, л
0,1	10	9,990
0,5	50	9,950
1,0	100	9,900

Приготовление рабочих растворов заданной концентрации производят в соответствии с расчетами по формуле: $K = V \cdot C \cdot 100$ (л, мл), где К- количество концентрата дезинфицирующего средства (л,мл,) V- объем рабочего раствора (л,мл, С- требуемая концентрация дезинфицирующего средства (‰)

Расчет количества воды (В), необходимой для приготовления рабочего раствора: $B = V - K$ (л, мл)

Ограничения:

Средство «Геохим» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007. при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ. Концентрат средства оказывает местно-раздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки глаз, обладает сенсибилизирующим действием. Пары 0,59% раствора и выше при многократном ингаляционном воздействии умеренно опасны.

Условия хранения:

Средство выпускается в пластмассовых канистрах ёмкостью 5л, 10л, 20 л а так же в еврокубах по 1000 л.

Организация - изготовитель, номер серии, даты изготовления и срок годности указаны на таре/упаковке.

Срок годности 2 года от даты выпуска при условии хранения в невскрытой упаковке изготовителя при температуре от +0°C до +25°C. Рабочие растворы сохраняют свою активность в течении 0.5 месяцев от даты приготовления при условии хранения при температуре не выше 20°C.

ГЛЕФОСТИМ



ГЛЕФОСТИМ

дезинфицирующее средство в форме раствора, представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, имеющую специфический запах, смешивается с водой в любых соотношениях.

Состав:

Активные вещества:

Глutarовый альдегид 250,0 гм/л Формальдегид 185 гм/л

Вспомогательные вещества: Четвертичные аммониевые основания

Бензил кокоалкилдиметиламмоний хлорид, 15 гм/л

Механизм действия заключается в нарушении окислительно-восстановительных процессов в микробной клетке, путем вступления в реакцию с аминогруппами белков микроорганизмов. Биоцидный эффект усиливается благодаря наличию в составе ПАВ.

Применение:

Рабочие растворы средства «Глефостим» готовят путем разведения определенного количества концентрата в воде и перемешивания, при этом сначала в емкость наливают воду, а затем добавляют концентрат:

Требуемая концентрация (по препарату), %	Количество средства и воды, необходимое для приготовления 10 литров рабочего раствора.	
	Средство, гр	Вода, л
0,1	10	9,990
0,5	50	9,950
1,0	100	9,900

Приготовление рабочих растворов заданной концентрации производят в соответствии с расчетами по формуле: $K = V \cdot C \cdot 100$ (л, мл), где К- количество концентрата дезинфицирующего средства (л,мл) V- объем рабочего раствора (л,мл), С- требуемая концентрация дезинфицирующего средства (‰).

Расчет количества воды (В), необходимой для приготовления рабочего раствора: $B = V - K$ (л, мл)

Ограничения:

Средство «Глефостим» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007. при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ Концентрат средства оказывает местно-раздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки глаз, обладает сенсибилизирующим действием. Пары 0,59% раствора и выше при многократном ингаляционном воздействии умеренно опасны.

Условия хранения:

Средство выпускается в пластмассовых канистрах ёмкостью 5л, 10л, 20 л а так же в еврокубах по 1000 л..

Организация - изготовитель, номер серии, даты изготовления и срок годности указаны на таре/упаковке.

Срок годности 2 года от даты выпуска при условии хранения в невскрытой упаковке изготовителя при температуре от +0 °С до +25 °С. Рабочие растворы сохраняют свою активность в течении 1.5 месяцев от даты приготовления при условии хранения при температуре не выше 20 °С.



ГУСИ ЛИВ-22



ПРОФИЛАКТИКА
ВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА ГУСЕЙ

ГУСИ ЛИВ-22

ГУСИ ЛИВ-22 – живая культуральная вакцина против вирусного энтерита гусей. Вакцина изготовлена из культурального апатогенного вируса энтерита гусей, штамм ЛИВ-22, размноженного в культуре клеток гусиных эмбрионов, с добавлением стабилизаторов: сахарозы (4%) и желатина (2%).

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к вирусному энтериту у гусят через 7-10 дней после однократного, а у взрослого поголовья в течение 14 суток после двукратного применения, который сохраняется в течение 4-6 месяцев; у гусят, полученных от вакцинированных гусынь сохраняется 14-20 дней.



Применение:

Вакцина предназначена для профилактики вирусного энтерита гусей в неблагополучных по данной болезни гусеводческих хозяйствах различного направления выращивания. Вакцину запрещается применять во время яйцекладки.

Вакцинации подлежат гуси родительского стада за 30-45 суток до начала каждой яйцекладки двукратно с интервалом в 14 дней.

Гусят, полученных от не вакцинированных птиц родительского стада, вакцинируют в суточном возрасте и ревакцинируют перед яйцекладкой.

Ремонтный молодняк, полученный от вакцинированных птиц родительского стада, вакцинируют в 15-20 - суточном возрасте однократно и ревакцинируют перед яйцекладкой.

Вакцину вводят внутримышечно в область бедра взрослым гусям в объеме 1 см³, а гусыням – 0,5 см³.

Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики вирусного энтерита гусей. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

Ограничения:

Ограничений в использовании мяса и яиц от птиц, привитых данной вакциной, нет.

Фасовка:

Вакцина расфасована по 5 см³ (50 доз), 100 см³ (1000 доз) в стеклянные флаконы.

Условия хранения:

Вакцину хранят в темном месте при температуре от 2°C до 8°C.





ДОКСИСТИМ 10%

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И БИОДОСТУПНОСТЬ



ВЫРАЖЕННАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ
В КЛЕТКИ И ТКАНИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ



СПОСОБНОСТЬ НАКАПЛИВАТЬСЯ
В ОЧАГЕ ВОСПАЛЕНИЯ



МУКОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ДОКСИСТИМ 10%

Доксициклина гиклат – 100 мг/мл

Бромгексин – 5 мг/мл

Раствор для орального применения. Входящий в состав лекарственного средства доксициклина гиклат является полусинтетическим антибиотиком тетрациклиновой группы третьего поколения, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, некоторых простейших, а также возбудителей микоплазмы, включая *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Treponema spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Chlamydia spp.*, *Rickettsiae spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bacteroides spp.*, *Listeria spp.*, а также *Mycoplasma spp.*

Применение:

Назначают свиньям и сельскохозяйственной птице с лечебной и лечебно-профилактической целью при микоплазмозе, колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, стафилококкозе, хронических респираторных заболеваниях и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину. Не следует применять лекарственный препарат супоросным и лактирующим свиноматкам, животным с выраженной печеночной недостаточностью, а также курам-несушкам в связи с накоплением доксициклина в яйцах.

ДОКСИСТИМ 10% применяют животных индивидуально или групповым способом с водой для поения в следующих дозах:

- птице и свиньям 0,5-1 мл на 1 л воды для поения (эквивалентно 50-100 мг доксициклина на 1 л воды) в течение 3-5 дней;
- телятам, козлятам, ягнятам перорально индивидуально 1 мл на 10 кг массы животного (эквивалентно 10 мг доксициклина на 1 кг массы животного) один раз в сутки в течение 3-5 дней.

Единственным источником питьевой воды для свиней и птицы во время лечения должна быть вода с лекарственным препаратом. Свежий раствор необходимо готовить каждые 24 ч.

Не рекомендуется применять ДОКСИСТИМ 10% совместно с миорелаксантами, бактерицидными антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп, минеральными добавками и лекарственными препаратами, содержащими соли кальция, магния, железа и алюминия, ввиду возможного снижения антибактериальной активности.

Ограничения:

Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток, телят, ягнят и козлят – не ранее чем через 14 суток, сельскохозяйственной птицы – не ранее, чем через 4 суток после последнего применения ДОКСИСТИМА 10%. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

Фасовка:

Стекланные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, пластиковые бутылки по 250, 500 и 1000 мл, пластиковые канистры по 2500, 5000 мл, пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 2°C до 25°C. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке – 4 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 6 месяцев, в готовом к применению растворе – 24 часа.



ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ



ВЫНУЖДЕННАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

•
ЭФФЕКТИВЕН
НА ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ

Йод однохлористый в своем составе содержит - йод однохлористый (3 %) и хлористоводородную кислоту (30 %), а также воду (до 100 %). Йод однохлористый - антисептический препарат. Обладает широким спектром противомикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, а также вирусов и грибов. Активен также против спор анаэробных бактерий, ооцист кокцидий, яиц ряда гельминтов.

Применение:

Дезинфекцию помещений проводят путем мелкокапельного орошения поверхностей помещений и технологического оборудования в отсутствие животных. Для распыления используют дезустановки типа ДУК-1, ДУК-1М, АВД-1, УДП-М, ЛСД-3М, ЛСД-ЭП и др.

Профилактическую дезинфекцию производственных животноводческих и птицеводческих помещений и технологического оборудования проводят по следующей схеме:

- дезинфекция гладких поверхностей (плитка, окрашенные стены или покрытие побелочной смесью, непористый пластик и др.) - 3% раствором при норме расхода 0,25-0,3 л/м² и экспозиции 3 ч;
- дезинфекция пористых поверхностей (кирпич, цемент, бетонные полы и др.) - 5% раствором из расчета 0,5 л/м² и экспозиции 3 ч.

Вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) помещений при инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии, проводят 3% раствором для гладких и 5% раствором для пористых поверхностей при норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 3-6 ч.

Также, обработку производят при сибирской язве, африканской чуме свиней, инфекционном атрофическом рините, роже свиней, инфекционной энтеротоксимии и браззоте овец, стригущим лишае методом прижигания, туберкулезу животных и птиц, респираторном микоплазмозе птиц и сальмонеллезу, кокцидиозе кроликов и птиц, параскаридозе лошадей и аскаридозе свиней, стронгилятозах и стронгилоидозах помещения. Можно проводить аэрозольную обработку воздуха животноводческих и птицеводческих помещений, в отсутствие животных и птиц; дезинфекцию яиц перед инкубацией, обработку вымени коров и птицеводческие помещения против ооцист кокцидий и яиц гельминтов.

Ограничения:

Продукты животноводства в период применения Йода однохлористого и после используют без ограничений. При приготовлении и применении рабочих растворов Йода однохлористого необходимо строго соблюдать меры предосторожности и личной безопасности. Все виды работ проводятся с использованием средств индивидуальной защиты.

Фасовка:

По 50, 100, 200, 400 мл в стеклянных флаконах, по 50, 100, 200, 500 мл в полимерных флаконах, по 1 и 3 л в полимерных бутылках, по 5, 10, 20, 30, 50 л в полимерных канистрах, по 1000 л в пластиковой емкости, по 100 и 200 л в бочке металлической.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, в складских условиях, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для посторонних лиц, детей и животных месте, при температуре от -40°С до 40°С.



ЙОДИНОЛ

ЙОД - 0,1%, КАЛИЯ ЙОДИД - 0,3%,
СПИРТ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ - 0,9%



ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

- ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ
- БАЛАНТИДИОЗА СВИНЕЙ
- КОКЦИДИОЗА

ЙОДИНОЛ

Йод - 0,1%, калия йодид - 0,3%, спирт поливиниловый - 0,9%

Йодинол обладает антисептическим свойством. При нанесении на поверхности йод усиливает процессы диссимиляции, обладает протеолитическим действием. Поливиниловый спирт – высокомолекулярное соединение, содержание которого в Йодиноле замедляет выведение йода и удлиняет его воздействие. Йод оказывает бактерицидное действие как на грамположительную, так и на грамотрицательную флору (активнее всего на стрептококковую флору и кишечную палочку), а также на патогенные грибы и дрожжи.

Применение:

Йодинол предназначен для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, свиноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое оборудование;
- вспомогательные объекты (включая инкубатории и яйцесклады) и находящиеся в них технологическое оборудование;
- санитарные бойни, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду;
- находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также и спецодежду;
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птиц, а также сырья и продукции животного происхождения);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

Дезинфекцию проводят путем мелкокапельного орошения, нанесения пены, погружения или протирания дезинфицируемых поверхностей Йодинолом. Обработку проводят ручным способом, замачиванием или с использованием дезустановок, пеногенерирующего или распыляющего оборудования, аэрозольно, с помощью генераторов горячего или холодного тумана.

Аэрозольную дезинфекцию проводят при отключенной вентиляции и в плотно (герметично) закрытом помещении.

Меры предосторожности:

Все работы с Йодинолом необходимо проводить в спецодежде. После окончания работы следует вымыть с мылом руки, лицо и прополоскать рот.

При случайном попадании средства внутрь – промыть желудок сначала 1% раствором натрия тиосульфата, затем водой. При попадении средства Йодинол в глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды или 1% раствором натрия тиосульфата.

В случае появления признаков отравления (кожные высыпания, ринит, слезотечение, гиперсаливация, ринорея, бронхорея, отек слизистых оболочек) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку дезинфицирующего средства Йодинол.

Фасовка:

Полимерные канистры по 5 л.

Условия хранения:

Хранить в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для посторонних лиц и животных месте, при температуре от 5°C до 35°C.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления.



ЙОДОСТИМ

ЙОД КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ - 50%



АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

•

ВРЕМЯ СГОРАНИЯ ШАШКИ
30-90 СЕКУНД

ЙОДОСТИМ

Йод кристаллический – 50%

ЙОДОСТИМ – дезинфицирующее средство в форме порошка для применения в виде фумигационного аэрозоля, предназначенное для санации воздуха в присутствии животных и дезинфекции объектов ветеринарного надзора. ЙОДОСТИМ содержит в качестве вспомогательных компонентов калий азотнокислый – 25% и углеводы (сахар, крахмал или декстрин) до 25%.

Йод, входящий в состав, обладает широким спектром антимикробного действия в отношении возбудителей инфекционных болезней бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. При термической возгонке образуются пары йода, обладающие высокой проникающей способностью.



Применение:

Применяют для профилактической и вынужденной аэрозольной дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений.

При проведении обработки расчетное количество ЙОДОСТИМ размещают в нескольких местах на поверхности пола, на несгораемых подставках по 2-4 шашки с порошком. Время сгорания 1 шашки – 30-90 секунд. При сгорании образуются пары йода от светло-коричневого до фиолетового цвета. Равномерное распределение паров по объему помещения происходит за счет конвекционных потоков воздуха.

При заболеваниях респираторного тракта (ларинготрахеит, инфекционный бронхит, аспергиллез, инфекционный ринотрахеит, бронхит и бронхопневмония телят и поросят) обработку проводят тремя циклами в месяц. Один цикл состоит из одной обработки в сутки в течение 7 дней подряд при концентрации паров йода 20 мг/м³ (1 флакон 40 г на 1000 м³) и экспозиции 30 мин, с последующим 7 дневным перерывом.

Для санации воздуха в присутствии животных (крупного рогатого скота, свиней или птицы) концентрация паров йода должна составлять 10 мг/м³ (1 флакон 40 г на 2000 м³). Обработку проводят 3 циклами в месяц. Один цикл состоит из одной обработки в сутки в течение 3 дней при экспозиции 30 мин и перерывом 7 дней.

Для дезинфекции объектов животноводства и птицеводства концентрация паров йода должна составлять 30 мг/м³ в воздухе обрабатываемого помещения. Для достижения указанной концентрации ЙОДОСТИМ применяют из расчета: 1 шашка 40 г на 650 м³ помещения при экспозиции 12 часов. Дезинфекцию проводят в отсутствии животных, при температуре не ниже 15 °С и относительной влажности не ниже 60%. По истечении времени экспозиции помещение проветривают в течение 30 мин, после чего разрешается ввод животных.

Обработку средством ЙОДОСТИМ в присутствии животных и птицы за один день до вакцинации, в день вакцинации и на следующий день после вакцинации запрещено.

Проведение мероприятий с использованием ЙОДОСТИМ в присутствии животных и птицы необходимо осуществлять при выключенной вентиляции помещений, закрытых дверях и окнах. При внешней температуре воздуха выше 25°С экспозиция не должна превышать 20 минут. При необходимости обработки поголовья животных и птицы во время высоких дневных температур профилактические и лечебные мероприятия переносятся на ранние утренние часы.

Меры предосторожности:

Обработку проводят с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты.



Фасовка:

Выпускают расфасованным по 40 г в полимерных упаковках.

Условия хранения:

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от открытого огня, нагревательных приборов и источников повышенной влажности при температуре от -10 до 30°С. Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.



КОЛИСТИМ 6М

ПОРОШОК ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ



НЕ ВСАСЫВАЕТСЯ В КИШЕЧНИКЕ
И ДЕЙСТВУЕТ НА ПАТОГЕННЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ В ЕГО СОДЕРЖИМОМ

КОЛИСТИМ 6М

Колистина сульфат

6000000 МЕ/г

Для лечения свиней, телят и сельскохозяйственной птицы при болезнях бактериальной этиологии. Колистина сульфат, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении многих патогенных микроорганизмов, включая *E. Coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.* и *Pasteurella spp.*. При пероральном введении колистина сульфат практически не всасывается в желудочно - кишечном тракте и не накапливается в органах и тканях, из организма выводится с фекалиями, в основном в неизменном виде.



Применение:

КОЛИСТИМ 6М применяют перорально индивидуально или групповым способом с питьевой водой в следующих дозировках:

С питьевой водой:

- птице: групповым способом 100-200 г препарата на 1000 литров питьевой воды или 12,5 мг/кг массы тела (75 000 МЕ/кг массы тела);
 - свиньям: групповым способом 150-200 г препарата на 1000 литров питьевой воды или 16,6 мг/кг массы тела (100 000 МЕ/кг массы тела);
 - телятам и ягнятам: индивидуально 20 мг/кг массы тела (125 000 МЕ/кг массы тела).
- Продолжительность курса лечения составляет 3-5 суток, при сальмонеллезе – 5-7 суток.

С кормом:

- свиньям, телятам, ягнятам: индивидуально в смеси с небольшим количеством корма два раза в день с 12-часовым интервалом 0,15 г на 1 кг корма или 10 мг/кг массы тела (62 500 МЕ/кг массы тела) или один раз в суточной дозе 0,3 г на 1 кг корма или 20 мг/кг массы тела (125 000 МЕ/кг массы тела).

Ограничения:

Использование мяса телят, ягнят, свиней разрешается не раньше, чем через 3 суток; птицы не ранее чем через 2 суток после последнего применения КОЛИСТИМА 6М.

Яйца кур-несушек в период применения лекарственного препарата разрешается использовать без ограничений.

Фасовка:

Выпускают расфасованным:

- по 100, 500 и 1000 г. в полимерные банки;
- по 100, 500, 1000 и 5000 г. в многослойные пакеты из полиэтилена, алюминиевой фольги и бумаги;
- по 10 и 20 кг. в многослойные мешки из полиэтилена и бумаги.

Условия хранения:

Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C. Допускается кратковременное (до 30 суток) транспортирование при температуре от -20 градусов до +30 градусов. Не допускается повторного замораживания.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 3 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 3 месяцев, в готовом к применению растворе - не более 12 часов.



КОЛИСТИМ 6М ОР

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

•
ДЕЙСТВУЕТ НА БАКТЕРИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО
В КИШЕЧНИКЕ

•
НЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ

•
НЕ ВЫЗЫВАЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ПАТОГЕНОВ

КОЛИСТИМ 6М ОР

Колистина сульфат
6000000 МЕ/мл

Раствор для орального применения. КОЛИСТИМ 6М ОР применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью свиньям, телятам, ягнятам и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе и других желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к колистину. Колистина сульфат, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении многих грамотрицательных микроорганизмов, включая *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.* и *Pasteurella spp.*

При оральном введении колистина сульфат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и не накапливается в органах и тканях, из организма выводится с фекалиями, в основном в неизменном виде.

Применение:

КОЛИСТИМ 6М ОР применяют с водой для поения молодняку жвачных животных индивидуально, свиньям и птице – групповым способом в течение 5-7 дней в следующих дозах:

- птице: групповым способом 100-150 мл. на 1000 литров питьевой воды (или 75000 МЕ по действующему веществу на 1 кг массы птицы);
- свиньям, телятам, ягнятам: групповым способом 150-250 мл. на 1000 литров питьевой воды или индивидуально из расчета 0,17/10 кг. массы животного (или 100 000 МЕ по действующему веществу на 1 кг. массы животного).
- При групповом способе применения, потребление воды, с растворенным лекарственным препаратом, зависит от клинического состояния животных. Чтобы получить правильную дозировку, концентрация колистина должна быть скорректирована с учетом ежедневного потребления воды. Раствор препарата необходимо готовить не реже 1 раза в сутки, желательно за 1-2 часа до применения.

Продолжительность лечения животных составляет 3 дня, при сальмонеллезе – 5 дней.

Не рекомендуется применять КОЛИСТИМ 6М ОР одновременно с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и левомицетином). Запрещается применять лекарственный препарат совместно с препаратами кальция и магния, а также ненасыщенными жирными кислотами.

Ограничения:

Использование мяса телят, ягнят, свиней разрешается не раньше, чем через 3 суток; птицы не ранее чем через 2 суток после последнего применения КОЛИСТИМА 6М ОР.

Яйца кур-несушек в период применения лекарственного препарата разрешается использовать без ограничений.


Фасовка:

Стекланные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, пластиковые бутылки по 250, 500 и 1000 мл, пластиковые канистры по 2500, 5000 мл, пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 28 суток, в готовом к применению растворе – не более 12-и часов.

КРЫСОЕД



Эффективное средство
для приманки крыс и мышей

КРЫСОЕД

Бродифакум 0,005%

Готовая к применению приманка, в форме мягкого брикета в бумажном пакетики красного или зеленого, или синего, или коричневого цвета. Предназначен для дератизационной обработки помещений, сельскохозяйственных построек, магазинов и складов в отношении серых крыс, домовых мышей, обыкновенных полевых.

Применение:

Средство по 1 брикету (10-20 г) для мышей или полевых, либо по 2 брикета (10-20 г) для крыс помещают в небольшие емкости типа приманочных ящичков, лотков, коробок в специальные картонные, пластиковые контейнеры, а также раскладывают на подложки из плотной бумаги, полиэтилена, одноразовые картонные или пластиковые тарелки.

В помещениях емкости с приманкой размещают на путях перемещения грызунов и, прежде всего, в углах, вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор.

Поедаемость и состояние разложенной приманки контролируют, после первой раскладки через 2 дня. В дальнейшем наличие и состояние приманки проверяют с интервалом в 1 неделю. Порции приманки по мере поедания или загрязнения, соответственно, добавляют или заменяют новыми. Контроль и раскладку приманки прекращают, если повсеместно остается нетронутой в течении продолжительного времени, что указывает на отсутствие грызунов.

Ограничения:

При использовании препарата необходимо соблюдать предосторожности согласно СанПин 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».

Все манипуляции с приманками проводят в спецодежде (халат, шапочка) и резиновых перчатках. Следует избегать попадания в рот и глаза. Не использовать в пищевую посуду!

При работе с приманкой запрещается курить, пить и принимать пищу.

Фасовка:

Картонная коробка по 10 кг с брикетами по 500 г.

Условия хранения:

Хранить в невскрытой упаковке, в сухом и хорошо вентилируемом, крытом складском помещении отдельно от пищевых продуктов, кормов и фуража, а также химических веществ, имеющих резкий запах. Хранят при температуре от -20°C до 25°C.

МУХОБОЙ



Эффективное средство
для приманки и уничтожения мух

МУХОБОЙ

инсектицидное средство в форме быстрорастворимого порошка, от белого до светло-желтого цвета, имеющего специфический запах.

Состав:

Действующее вещество: Тиаметоксам -10%

Вспомогательные компоненты:

2-9-трикозен (половой феромон мух); Лактоза; Крахмал.

Тиаметоксам, входящий в состав средства, относится к группе неоникотиноидов. Тиаметоксам обладает контактным и кишечным инсектицидным действием в отношении мух, блох и тараканов. Тиаметоксам блокирует никотин-ацетилхолиновые рецепторы постсинаптических мембран нервных клеток, что приводит к гибели насекомых.

«Мухобой» активен в отношении насекомых, резистентных к фосфорорганическим инсектицидам, пиретроидам и карбаматам. Трикозен, половой феромон мух, привлекает насекомых к местам нанесения средства. «Мухобой» начинает действовать через 3 — 5 минут после контакта насекомых со средством.

Дозы и способы применения:

Инсектицидное средство «Мухобой» применяют в сухом (нативном) виде и в виде раствора путем нанесения мазков на поверхность. Порошок растворяют в чуть теплой воде согласно расположенной ниже схеме и описанию каждого способа по отдельности. Раствор средства должен быть использован сразу же после его приготовления, либо в течение одного дня. Перед применением раствора его следует очень тщательно размешать. Если процесс обработки был приостановлен более чем на 30 минут, раствор «Мухобой» следует повторно перемешать.

Метод обработки	Инсектицидное средство «Мухобой»	Вода	Количество полосок размером 10х30 см	Площадь пола помещения
Нанесение мазков на поверхность	100 г	80 мл	не менее 8	40 кв.м
	400 г	320 мл	не менее 30	160 кв.м
Сухое средство	100 г	-	-	100 кв.м

Противопоказания:

Запрещается обрабатывать поверхности, с которыми будут соприкасаться продукты питания или корм, кормушки и поилки, а также поверхности, с которыми могут контактировать животные. Средство не следует наносить на грязные, сильно пористые, либо свежепобеленные поверхности. Не выливать остатки средства в раковину или канализацию.

Условия хранения:

Выпускают расфасованным по 100 г., 400 г. и 1500 г. в пластмассовые ёмкости соответствующей вместимости, укуренные пластиковыми крышками с контролем первого вскрытия. Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги, недоступном для детей и домашних животных. Отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от -10 С до +30 С. Срок годности — 5 лет.



ОКСИСТИМ 20%

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ



ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА
ЗАБОЛЕВАНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

•

ОБЛАДАЕТ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ

•

КУРС ЛЕЧЕНИЯ - 1 ИНЪЕКЦИЯ

ОКСИСТИМ 20%

Окситетрациклина дигидрат – 200 мг/мл

Раствор для инъекций. Окситетрациклина дигидрат, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе, *Actinomyces pyogenes*, *Bordetella spp.*, *Clostridium spp.*, *Escherichia coli*, *Listeria spp.*, *Moraxella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, а также некоторых видов *Mycoplasma spp.*, *Rickettsiae spp.*, *Chlamydia spp.*, *Protozoa spp.* и крупных вирусов.

ОКСИСТИМ 20% назначают крупному рогатому скоту, овцам и свиньям для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза, атрофического ринита, энзоотического аборта и других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тетрациклинам.

Применение:

ОКСИСТИМ 20% применяют однократно глубоко внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного.

При атрофическом рините препарат применяют трехкратно в указанной дозе на 3, 12 и 21 день жизни животного. Максимальный объем раствора для введения в одно место не должен превышать 20 мл крупному рогатому скоту, 10 мл овцам и свиньям, 1 мл пороссятам до 10 кг.

При лечении животных не следует применять ОКСИСТИМ 20% одновременно с кортикостероидами, антикоагулянтами, эстрогенсодержащими лекарственными препаратами, а также смешивать его в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

Ограничения:

Убой животных на мясо животных разрешается через 30 дней после последней инъекции лекарственного препарата.

Молоко, полученное от коров в период применения препарата ОКСИСТИМ 20% и до истечения 7 суток последнего введения лекарственного препарата, запрещается использовать для пищевых целей.

Фасовка:

Флаконы из темного стекла по 10, 20, 50, 100, 250 и 500 мл; полимерные контейнеры по 100, 250, 500 и 1000 мл.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке – 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 28 суток.



РАСТВОР ЙОДА 5% СПИРТОВОГО - И ЙОД КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ - 5 г



АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

•

РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

•

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

РАСТВОР ЙОДА 5% СПИРТОВОГО - И **Йод кристаллический - 5 г**

Раствор йода 5% спиртового – И – лекарственный препарат в виде раствора представляет собой прозрачную жидкость красновато-бурого цвета с характерным запахом йода. В 100 мл содержит в своем составе йод кристаллический 5 г, вспомогательное вещество калий йодистый, спирт изопропиловый и воду очищенную. Раствор йода спиртового обладает широким спектром антимикробной активности, он убивает основные патогенны и при длительном воздействии даже споры, которые считаются наиболее сложной формой микроорганизмов для инактивации дезинфицирующими средствами и антисептиками.

Применение:

Раствор йода 5% спиртовой – И применяют в качестве дезинфицирующего средства для проведения:

- стерилизации хирургических инструментов;
- дезинфекции рабочих поверхностей оборудования и приборов, термическая обработка которых нежелательна. Обработку хирургических инструментов и рабочих поверхностей проводят чистой губкой, смоченной «Раствором йода 5% спиртовым – И».

Меры предосторожности:

При работе с «Раствором йода 5% спиртовым – И» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. По окончании работ руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте «Раствора йода 5% спиртового – И» с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с «Раствором йода 5% спиртовым – И», работать в средствах индивидуальной защиты. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании средства в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Фасовка:

Пластиковые бутылки по 1 л, стеклянные флаконы из оранжевого стекла с навинчивающимися крышками - по 100 мл.

Условия хранения:

Хранить средство в закрытой упаковке, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от -20°C до 25°C. Следует хранить в недоступном для посторонних лиц и животных месте.

При соблюдении условий хранения срок годности составит 3 года со дня производства.



РЕДУЦИД

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

•
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ БАКТЕРИЙ,
ВИРУСОВ, ГРИБКОВ И СПОР

•
ЭКОНОМИЧЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

•
НИЗКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

РЕДУЦИД

Дезинфицирующее средство для объектов ветеринарного надзора, который активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов (в том числе вирусов африканской и классической чумы свиней) и грибов (в том числе против спорообразующих форм, дрожжей и плесени).

В состав входит композиция двух четвертичных аммониевых соединений 24,91% (алкилдиметилбензиламмония хлорид 17,09% и дидецилдиметиламмония хлорид 7,82%) глутарового альдегида – 10,8%, изопропанола – 17%, скипидара живичного 2%, воды.

Применение:

Для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, свиноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения и находящееся в них технологическое оборудование;
- вспомогательные объекты и находящееся в них технологическое оборудование;
- санитарные бойни, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территория, предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а так же и спецодежду;
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птиц, а также сырья и продукции животного происхождения);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

Для профилактической дезинфекции вышеуказанных объектов, имеющих гладкую поверхность, применяют водный (рабочий) раствор, в концентрации 0,25% и экспозиции 20 мин. Шероховатые поверхности дезинфицируют водным (рабочим) раствором РЕДУЦИДА в концентрации 0,25% при норме расхода 0,35 л/м² и экспозиции 30 мин. Для проведения вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при инфекционных заболеваниях различной этиологии, имеющих гладкие или шероховатые поверхности, применяют водной (рабочий) раствор РЕДУЦИДА в концентрации 0,5% при норме расхода 0,2-0,4 л/м² и экспозиции 3 часа методом мелкокапельного орошения, нанесения пены, погружение или протирания дезинфицируемых поверхностей водным (рабочим) раствором. Для дезинфекции объектов ветеринарного надзора при Африканской чуме свиней рекомендуется однократная обработка путем орошения 1% раствором РЕДУЦИДА при норме расхода 0,3 л/м² с экспозицией 1 час. Для дезинфекции объектов ветеринарного надзора при Гриппе птиц рекомендуется однократная обработка путем орошения 0,5% раствором РЕДУЦИДА при норме расхода 0,35 л/м² с экспозицией 1 час. Для дезинфекции объектов ветеринарного надзора при Сибирской язве рекомендуется однократная обработка путем орошения 6% раствором РЕДУЦИДА при норме расхода 0,3 л/м² с экспозицией 15 минут (для непитывающих поверхностей).

Возможна локальная дезинфекция отдельных, свободных от животных стойл, клеток, единиц оборудования, инвентаря и участков поверхностей при обеспечении интенсивной близости к обрабатываемым объектам. Обработку следует проводить 0,25% раствором РЕДУЦИДА методом спрея, генерирования пены, замачивания или методом протирания поверхности.

Дезбарьеры или дезковрики заправляют 0,5% раствором РЕДУЦИДА. Замену дезинфицирующего раствора проводят по мере необходимости, но не реже, чем 2 раза в 7 суток.

Для применения рабочих растворов РЕДУЦИДА при отрицательных температурах рекомендуется готовить рабочий раствор на основе 30% водного раствора этиленгликоля.

Фасовка:

Полимерные бутылки по 0,5 л и 1 л; пластиковые канистры по 5, 10 и 20 л; металлические бочки по 210 л.

Условия хранения:

В закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от - 20°C до 35°C.

Срок годности 3 года со дня производства, срок хранения рабочих растворов - не более 30 суток.



РЕДУЦИД-С



РЕДУЦИД-С

Дезинфицирующее средство в форме порошка для объектов ветеринарного надзора, который активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов (в том числе вирусов африканской и классической чумы свиней) и грибов (в том числе против спорообразующих форм, дрожжей и плесени)

Редуцид – С содержит в качестве действующего вещества 50% калия пероксомоносульфат (активный кислород

9,5%-15%), а в качестве вспомогательных компонентов: поверхностно-активное вещество (натрия додецилбензолсульфонат), органические кислоты, неорганические буферные системы (натрия хлорид, натрия полифосфат), краситель розовый, отдушка цитрусовая.

Применение:

Редуцид С применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческих, свиноводческих, звероводческих, птицеводческих помещений, в т.ч. инкубаториев, находящегося в них технологического оборудования и инвентаря;
- помещений кормоцехов, кормокухонь и других вспомогательных объектов животноводства, находящегося в них технологического оборудования и инвентаря;
- производственных помещений и технологического оборудования на предприятиях мясо и птицеперерабатывающей промышленности, цехов по переработке продуктов убоя, помещений санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктов, молочных блоков на молочно-товарных фермах и комплексах, яйлескладов, а также тары для хранения и перевозки кормов и продукции животного происхождения;
- автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств, используемых для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения;
- помещений, оборудования и инвентаря в местах скопления животных (рынках для торговли животными, выставках);
- ветеринарных учреждений (лечебницы, клиники, лаборатории, виварии, питомники), находящегося в них оборудования, инвентаря, инструментов и лабораторной посуды;
- поверхностей в помещениях для содержания животных, клеток и инвентаря в питомниках по разведению собак и кошек, зоопарках и цирках;
- обеззараживание воды для поения животных и систем водоснабжения

Дезинфекцию проводят путем мелкокапельного орошения, нанесения пены, погружения или протирания дезинфицируемых поверхностей водным (рабочим) раствором Редуцида С. Обработку проводят в присутствии животных, продуктов убоя и продукции животного происхождения ручным способом, замачиванием или с использованием дезустановок, пеногенерирующего или распыляющего оборудования, аэрозольно, с помощью генераторов горячего или холодного тумана.

Фасовка:

Полимерная банка 2,5 кг

Условия хранения:

В закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов рабочих растворов – не более 30 суток.



РЫБИЙ ЖИР



ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ А, D, E
и ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

•

УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ

•

РЕГУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ ТРОМБОЦИТОВ

РЫБИЙ ЖИР

Кормовая добавка содержит смесь очищенных жиров морских рыб, богатых полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3, Омега-6, Омега-9, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая) и витаминами А, D и Е, брома, йода, полиненасыщенных жирных кислот, органических соединений серы и фосфора. Укрепляет иммунную систему. Благоприятно влияет на рост и развитие животных. При внутримышечном введении действует как биогенный стимулятор.

Применяют внутрь для профилактики и лечения недостаточности витамина А, рахита, остеомаляции, хронических инфекций, анемии, аллергии, желудочно-кишечных заболеваний, язвы желудка, половых нарушений.

Используют как общеукрепляющее средство, а также для ускорения сращения костных переломов. Наружно назначают для лечения себореи, дерматитов, экзем, обморожений, ожогов, труднозаживающих ран и язв, иритов, конъюнктивитов и др.

Применение:

Рыбий жир применяют животным внутрь в следующих дозах: коровам — 100-500 мл, лошадям — 40-200 мл, овцам и козам — 20-100 мл, свиньям — 4-70 мл, собакам и песцам — 10-30 мл, кошкам — 5-10 мл, птице — 2-5 мл, цыплятам, утятам и гусятам — 0,3-0,5 мл. Наружно назначают при системной терапии поражений кожи и слизистых оболочек, для лечения себореи, дерматитов, экзем, обморожений, ожогов, труднозаживающих ран и язв, иритов, конъюнктивитов и др. При наружном использовании смачивают рыбьим жиром повязки и смазывают пораженные поверхности.

Ограничения:

Желательно не применять цыплятам-бройлерам и животным перед убоем, так как препарат придает продукции запах рыбы.

Животноводческую и птицеводческую продукцию после применения рыбьего жира можно использовать без каких-либо ограничений.

Фасовка:

Пластиковая канистра 5 л.

Условия хранения:

В хорошо закупоренной посуде в защищенном от света, прохладном и недоступном для детей и животных месте. Не допускать воздействия высоких температур. Срок годности — 1 год.



ТИЛМОСТИМ 25%

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ОТЛИЧНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ В КЛЕТКИ И ТКАНИ

ДЕЙСТВИЕ НА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

НЕ ВЫЗЫВАЕТ УСТОЙЧИВОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ

ТИЛМОСТИМ 25%

Тилмикозин в форме фосфата – 250 мг

ТИЛМОСТИМ 25% - раствор для орального применения, полусинтетический антибиотик группы макролидных антибиотиков с широким спектром действия, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Clostridium spp.*, *Arcanobacterium spp.* (*Corynebacterium*), *Brachyspira hyodysenteriae*, *Chlamydia spp.*, *Spirochetes spp.*, *Actinodacillus pleuropneumoniae*, *Mannheimia haemolytica* и *Mycoplasma spp.*

Назначают с лечебной и профилактической целью:

- птицам при инфекциях дыхательной системы, вызванных микоплазмами и пастереллой;
 - свиньям при респираторных заболеваниях: микоплазмозах, плеввропневмониях, пастереллезе;
 - телятам при инфекционных заболеваниях органов дыхания: микоплазмозах, пастереллезе, плеввропневмониях;
- ТИЛМОСТИМ 25% также назначают при смешанных инфекциях, вторичных инфекциях на фоне вирусных заболеваний и других инфекционных болезней животных и птиц, возбудители которых чувствительны к тилмикозину.

Применение:

ТИЛМОСТИМ 25% применяют животным и птице с водой для поения в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- птице – с водой для поения в суточной дозе 3 мл на 10 л воды (15-50 мг тилмикозина фосфата на 1 кг массы птицы);
- свиньям – индивидуально или групповым способом 8 мл на 10 л воды (15-20 мг тилмикозина фосфата на 1 кг массы животного);
- телятам – индивидуально с водой для поения или заменителем молока два раза в день по 0,5 мл на 10 кг массы животного (6,25 мг тилмикозина фосфата на 1 кг массы животного).

Лечебный раствор ТИЛМОСТИМА 25% в период лечения цыплят и поросят должен являться единственным источником питьевой воды. Лечебный раствор готовят ежедневно.

ТИЛМОСТИМ 25% не применяется одновременно, а также в течение 7 дней до и 7 дней после применения ионофорных кокцидиостатиков, антибиотиков алимогликозидного ряда, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты). В целях предотвращения адсорбции и снижения антибактериальной активности лекарственное средство не следует применять одновременно с препаратами и кормовыми добавками, содержащими бентонит.

Запрещается применять жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением, животным с выраженными нарушениями функции печени и (или) почек, а также курам-несушкам, яйцо которых используется для пищевых целей.

Ограничения:

Убой свиней и птицы на мясо разрешается через 16 суток, телят – через 35 суток после окончания применения ТИЛМОСТИМА 25%. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока, мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Фасовка:

Стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, пластиковые бутылки по 250, 500 и 1000 мл, пластиковые канистры по 2500, 5000 мл, пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке – 2 года со дня производства, после вскрытия упаковки не более 1-го месяца, в растворе готового препарата – 24 часа с момента приготовления раствора.



ТРИСУЛЬФАСТИМ

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ
СИНЕРГИДНЫЕ ФОРМЫ СУЛЬФАНИАМИДОВ,
УСИЛИВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА

ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ
ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ,
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ,
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ТРИСУЛЬФАСТИМ

Сульфадиазин – 200 мг, Триметоприм – 40 мг

Раствор для орального применения. Антибактериальный эффект препарата обусловлен синергизмом действия триметоприма и сульфадиазина в отношении патогенных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Meningococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Nocardia spp.*, *Escherichia spp.*, *Shigella spp.*, *Salmonella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Bacillus spp.*, *Actinomyces spp.*, *Bordetella spp.*, *Yersinia pestis*, *Brucella spp.*, *Clostridium spp.* и *Corynebacterium spp.*

Назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку птиц – при пастереллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, кокцидиозе, молодняку крупного рогатого скота – при колисептицемии, сальмонеллезе, пастереллезе, бронхопневмонии, абсцессах, вызванных стафилококками, полиартритах, вызванных стрептококками; свиньям – при колибактериозе, атрофическом рините, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезной плевропневмонии.

Применение:

ТРИСУЛЬФАСТИМ применяют перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения в следующих дозах:

- цыплятам-бройлерам и индейкам – 1 мл на 1 л воды для поения;
- телятам (индивидуально) – 1 мл на 10 кг массы тела;
- пороссятам – 1 мл на 10 кг массы тела с учетом суточной потребности в питьевой воде.

Продолжительность лечения составляет 5 дней.

Запрещается применять птице, яйца которых используются в пищевых целях, а также лактирующим и беременным самкам.

Запрещается применение ТРИСУЛЬФАСТИМА одновременно с парааминобензойной кислотой, прокаинамом, другими местными анестетиками и водой для поения, pH которой ниже 6,5. Так же препарат не должен применяться с витамина группы В (никотинамид, фолиевая кислота, холин) из-за их антагонистического действия на сульфаниламиды.

Ограничения:

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем:

- телят – через 9 суток после последнего применения препарата;
- поросят – через 7 суток после последнего применения препарата;
- цыплят-бройлеров – через 3 суток после последнего применения препарата;
- индеек – через 7 суток после последнего применения препарата.

Фасовка:

Стекланные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, пластиковые бутылки по 250, 500 и 1000 мл, пластиковые канистры по 2500, 5000 мл, пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке – 3 года со дня производства, после вскрытия упаковки не более 1-го месяца, в растворе готового препарата – 12 часов с момента приготовления раствора.

ФЕРРОСТИМ 200

ЖЕЛЕЗО 200 мг



ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

•

СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ ГЕМОГЛОБИНА

•

УСКОРЯЕТ РОСТ ОРГАНИЗМА

•

НОРМАЛИЗУЕТ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ФЕРРОСТИМ-200

Железо – 200 мг

ФЕРРОСТИМ-200 относится к железосодержащим лекарственным препаратам. Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов, ферментов каталазы и пероксидазы, которые участвуют в транспорте кислорода и окислительно-восстановительных реакциях.

ФЕРРОСТИМ-200 стимулирует эритропоэз за счет активного включения железа в гемоглобин и тканевые ферменты (цитохромы, цитохромоксидазы, пероксидазы и др.), повышает резистентность организма и производительность сельскохозяйственных животных.

После парентерального введения препарата комплекс железа (III)-декстран-гептоновой кислоты медленно высвобождает Fe^{3+} , что обеспечивает продолжительное действие ФЕРРОСТИМА-200 в организме. В кровотоке железо связывается с трансферрином, в тканях депонируется в составе ферритина, в костном мозге включается в гемоглобин и используется в процессе эритропоэза. Препарат выводится с мочой.

Применение:

ФЕРРОСТИМ-200 применяют для профилактики и лечения железодефицитной анемии у поросят, телят, ягнят и норок.

Поросятам препарат вводят на третий или четвертый день жизни однократно глубоко внутримышечно в область шеи или верхней трети бедра в дозе 0,75-1,0 мл на животное.

Телятам препарат вводят на третий или четвертый день жизни однократно глубоко внутримышечно в область шеи или верхней трети бедра в дозе 4,0-6,0 мл на животное.

Ягням препарат вводят на третий или четвертый день жизни однократно глубоко внутримышечно в область шеи или верхней трети бедра в дозе 1,0-1,5 мл на животное.

Самкам норок весной в период кормления щенков препарат вводят однократно подкожно или внутримышечно в дозе 0,15 мл на животное.

Щенкам норок в возрасте 6-12 недель препарат вводят однократно подкожно или внутримышечно в дозе 0,1 мл на животное.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата на месте инъекции может возникнуть покраснение тканей или незначительная припухлость, которые исчезают спонтанно в течение 2-3 дней.

Ограничения:

Убой животных на мясо после применения лекарственного препарата разрешается без ограничений.

Фасовка:

Стекланные флаконы по 100 мл.

Условия хранения:

Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 28 суток.



ФЛОРИСТИМ 10%

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ



ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
БАКТЕРИЙ



ЛЕЧЕНИЕ СВИНЕЙ И ПТИЦЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

ФЛОРИСТИМ 10%

Флорфеникол – 100 мг

Раствор для орального применения. Флорфеникол, входящий в состав препарата, является производным тиамфеникола, обладает широким спектром бактериостатического действия, активен в отношении *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus spp.*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, в том числе в отношении бактерий, которые производят ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу.

ФЛОРИСТИМ 10% назначают:

- птицам при колисептицемии, пастереллезе, стафилококкозе, респираторных болезнях бактериальной этиологии, в том числе вызванных *Ornithobacterium rhinotracheale*;
- свиньям при плевропневмонии, вызванной *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, атрофическом рините, вызванном *Pasteurella multocida* и *Bordetella bronchiseptica*.

Применение:

ФЛОРИСТИМ 10% применяют перорально с водой для поения в следующих суточных дозах:

- птицам – 20 мг флорфеникола на 1 кг массы птицы, что соответствует: цыплятам до 4-недельного возраста – 100 мл препарата на 100 л воды, другим возрастным категориям птиц – 200 мл препарата на 100 л воды. Курс применения препарата – 3 суток, при сальмонеллезе и смешанных инфекциях – 5 суток;
- свиньям – 5 мг флорфеникола на 1 кг массы животного, что соответствует 5 мл препарата на 100 кг массы животного, в течение 7 суток.

В период лечения птицы и свиньи должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. В случае, если это невозможно, суточную дозу препарата делят на 2 равные части и выпаивают с интервалом 12 часов. Запрещается применять ФЛОРИСТИМ 10% курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением флорфеникола в яйцах, а также супоросным свиноматкам и хрякам-производителям.

В случае передозировки препарата возможно уменьшение потребления корма и воды, снижение привесов, у свиней – перианальная эритема и отек.

Не допускается применять ФЛОРИСТИМ 10% одновременно с тиамфениколом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, цефалоспорины и фторхинолоны.

Ограничения:

Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 6 суток, птиц – не ранее чем через 2 суток после последнего применения ФЛОРИСТИМА 10%.

Фасовка:

Стекланные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, пластиковые бутылки по 250, 500 и 1000 мл, пластиковые канистры по 2500, 5000 мл, пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке – 2 года со дня производства, после вскрытия упаковки не более 1-го месяца, в растворе готового препарата – 24 часа с момента приготовления раствора.



ЦИПРОСТИМ 10%

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ

•

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
С ДРУГИМИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ

ЦИПРОСТИМ 10%

Ципрофлоксацин – 100 мг

Раствор для орального применения. Ципрофлоксацин, входящий в состав лекарственного препарата обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая *E.coli*, *Haemophilus*, *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Pseudomonas*, *Proteus*, *Bordetella*, *Brucella*, *Chlamydia*, *Enterobacter*, *Campylobacter*, *Erysipelothrix*, *Corynebacterium*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Actinobacillus*, *Clostridium*, *Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Corina*, а также *Mycoplasma* spp.

Назначают с лечебной целью телятам, ягнятам, козлятам, свиньям и сельскохозяйственным птицам при респираторных, желудочно-кишечных, мочеполовых инфекциях, артритах, колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, септицемии, некротическом энтерите, перитоните, смешанных и вторичных инфекциях при вирусных болезнях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к ципрофлоксацину. Запрещается применение препарата курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, ввиду накопления ципрофлоксацина в яйцах. Не следует применять препарат взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением, животным с выраженными нарушениями развития.

Применение:

ЦИПРОСТИМ применяют индивидуально или групповым способом с водой для поения в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- телятам, ягнятам, козлятам – 0,25 мл препарата на 10 кг массы животного два раза в день;
- свиньям – 1 мл препарата на 10 кг массы;
- бройлерам, мясным индейкам, родительскому бройлерному стаду – 50 мл препарата на 100 литров воды

для поения.

При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и при хронических формах заболеваний птиц рекомендуемая доза ЦИПРОСТИМА составляет 100 мл на 100 л воды для поения и продолжительности курса лечения – 5 дней.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственное средство. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птице в течение суток.

Не допускается использование ЦИПРОСТИМА совместно с левомицетином, макролидами, циклоспорином, тетрациклинами, теофилином и нестероидными противовоспалительными средствами, а также с препаратами, содержащими катионы магния, алюминия и кальция, которые, связываясь с ципрофлоксацином, препятствуют его адсорбции.

Ограничения:

Убой птицы на мясо разрешается не ранее, через 14 суток после последнего применения ЦИПРОСТИМА. Мясо птицы, вынужденно убитой до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Фасовка:

Стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, пластиковые бутылки по 250, 500 и 1000 мл, пластиковые канистры по 2500, 5000 мл, пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке – 2 года со дня производства, после вскрытия упаковки не более 3-х месяцев, в растворе готового препарата – 24 часа с момента приготовления раствора.



ЭЙМЕСТАТ 2,5%

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ВСЕХ ВИДОВ КОКЦИДИЙ
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ У ПТИЦ

•
ОБЛАДАЕТ КОКЦИДИОЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ

•
НЕ ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА К
КОКЦИДИОЗУ

•
НЕ ТОКСИЧЕН

ЭЙМЕСТАТ 2,5%

Толтразурил – 25 мг/мл

Лечение и профилактика кокцидиоза кур, вызванного *E.acervulina*, *E.brunetti*, *E.maxima*, *E.necatrix*, *E.tenella*, *E.mitis*; кокцидиоза индеек, вызванного *E.adenoides*, *E.meleagridis*; кокцидиоза гусей и уток, вызванного *E.anseris*, *E.truncata*.

Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата относится к группе триазинтриона, обладает широким спектром действия и высокой степенью безопасности. Толтразурил эффективен в отношении всех видов паразитирующих у птиц кокцидий на стадиях внутриклеточного развития паразитов, в том числе штаммов, резистентных к другим антикокцидийным препаратам. (Толтразурил, блокируя дыхательные ферменты и оказывая повреждающее действие на митохондрии, процессы деления ядра кокцидий и формирования микрогаметоцитов, вызывает гибель паразитов).

Применение:

ЭЙМЕСТАТ 2,5% применяют птице при кокцидиозе с лечебно-профилактической целью, при достижении критического уровня содержания кокцидий в подстилке (10-20 тыс/г), а также при появлении клинических признаков заболевания.

С водой для поения два дня подряд в дозе 7 мг толтразурила (ДВ) на 1 кг живой массы (28 мл ЭЙМЕСТАта 2,5% на 100 кг живой массы), что эквивалентно:

- 1 мл ЭЙМЕСТАта 2,5% на 1 л воды, которую выпаивают птице в течение 48 часов или
- 3 мл ЭЙМЕСТАта 2,5% на 1 л воды, которую выпаивают птице по 8 часов в сутки 2 дня подряд.

В случае тяжелых инвазий курс лечения можно повторить через 5 дней.

Ограничения:

Использование мяса бройлеров в пищу людям разрешается не ранее чем через 14 дней, гусей и уток не ранее, чем через 16 дней, после последнего применения препарата.

Фасовка:


Выпускают расфасованным по 100 мл. в стеклянные флаконы; в пластиковых бутылках – по 250 мл, 500 мл, 1000 мл, по 5000 мл, 1000 мл в пластиковой канистре.

Условия хранения:

Препарат хранят в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°C до 25°C, отдельно от пищевых продуктов и кормов.

ЭЙМЕСТАТ 2,5% следует хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со дня производства, после вскрытия упаковки - 3 месяца.





ЭЙМЕСТАТ 5%

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИКОКЦИДИЙНОГО
ДЕЙСТВИЯ

•

НЕЙТРАЛЕН К БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРЕ ЖКТ

•

НЕ ФОРМИРУЕТ ИММУНОСУПРЕССИЮ
У ЖИВОТНЫХ

•

ЭКОНОМИЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН

ЭЙМЕСТАТ 5%

Толтразурил – 50 мг/мл

Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, это синтетическое вещество, которое относится к группе триазинтриона, обладает широким спектром антикокцидийного действия и высокой степенью безопасности. Толтразурил эффективен в отношении всех видов кокцидий, паразитирующих у свиней и крупного рогатого скота, на стадиях внутриклеточного развития паразитов, включая *Isoospora suis*, *E. arloingi*, *E. scabra*, *E. guevarai*, *E. bovis*, *E. zuernii*, *E. alabamensis*, а также эймерий кроликов *E. stiedae*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. calcicola*, *E. irrisidua*, *E. perforans*, *E. piriformis*, в том числе штаммов, резистентных к другим антикокцидийным препаратам. ЭЙМЕСТАТ 5% назначают пороссятам и молодняку крупного рогатого скота до 9-месячного возраста с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе.

Применение:

ЭЙМЕСТАТ 5% применяют пороссятам и молодняку крупного рогатого скота до 9-месячного возраста перорально индивидуально однократно с помощью специального дозатора в следующих дозах:

- пороссятам на 3-5 день жизни в дозе 20 мг толтразурила на 1 кг живой массы, что соответствует 0,4 мл суспензии на 1 кг живой массы, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное;
- телятам с 2-недельного возраста в дозе 15 мг толтразурила на 1 кг живой массы, что соответствует 3 мл суспензии на 10 кг живой массы;
- кроликам с 4-недельного возраста в дозе 7,5 мг. Толтразурила на 1 кг. массы тела, что соответствует 0,14 мл. препарата на 1 кг. массы животного.

Перед применением суспензию в емкости следует тщательно взболтать.

В неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах для достижения максимального профилактического эффекта и снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, ЭЙМЕСТАТ 5% следует назначать животным до появления в стаде первых клинических признаков заболевания.

ЭЙМЕСТАТ 5% совместим с витаминами, известными кормовыми добавками и лекарственными средствами, применяемыми в животноводстве.

Ограничения:

Использование мяса свиней в пищу людям разрешается не ранее чем через 91 сутки, молодняка крупного рогатого скота и кроликов не ранее, чем через 70 суток после применения ЭЙМЕСТАТА 5%.

Фасовка:

Стекланные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, пластиковые бутылки по 250, 500 и 1000 мл, пластиковые канистры по 2500, 5000 мл, пластиковые бочки по 10, 20 л.

Условия хранения:

Препарат хранят в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2°C до 25°C, отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 5 лет со дня производства, после вскрытия упаковки - 3 месяца.



ЭНРОКОЛИСТИМ

РАСТВОР ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРВЫЙ ВЫБОР ПРИ СМЕШАННЫХ ИНФЕКЦИЯХ И
ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕВЫЯСНЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОТИВОМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
МИКОПЛАЗМОЗНЫХ И
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО
ТРАКТА

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И РЕСПИРАТОРНЫХ ОРГАНОВ

ЭНРОКОЛИСТИМ

Энрофлоксацин – 100 мг/мл

Колистина сульфат – 2000000 МЕ/мл



Для лечения сельскохозяйственной птицы, свиней, телят, ягнят при бактериальных и микоплазмозных инфекциях. При совместном применении энрофлоксацин и колистин оказывают взаимоусиливающее действие на микроорганизмы за счет различных механизмов бактерицидного действия. Поэтому резистентность к антибактериальным компонентам препарата развивается медленно. Энрофлоксацин обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Staphylococcus* spp., *Staphylococcus hyicus*, *Streptococcus* spp., *Erysipelothrix* spp., *Proteus* spp., *Brucellacanis*, *Actinobacillus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Haemophilus* spp., *Clostridium* spp., а также *Mycoplasma* spp. Сочетание энрофлоксацина и колистина сульфата обладает синергетическим действием против *E. coli* и *P. multocida*.

Применение:

Цыплятам-бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку, индейкам, свиньям, телятам, ягнятам для лечения и профилактики респираторных и кишечных заболеваний бактериальной этиологии, в том числе колибактериоза, а также смешанных вторичных инфекций, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и его комбинации с колистином.

ЭНРОКОЛИСТИМ применяют перорально, смешивая с водой, в течение 3-5 дней.

- Птице в суточной дозе 0,5-1,0 мл на 1 л питьевой воды или 0,1 мл на 1 кг живой массы.

- Свиньям, телятам, ягнятам (до 3-месячного возраста) – 0,3 мл/кг живой массы с водой для поения в разведении 1:1 или постоянно с питьевой водой 0,5-0,75 мл на 1 л воды; при тяжелой форме заболевания суточную дозу лекарственного средства увеличивают до 0,5 мл/кг живой массы.

В период лечения вода с лекарственным препаратом должна служить единственным источником питья для птиц и животных.

Продолжительность курса лечения составляет 3-5 суток; при сальмонеллезе, смешанных инфекциях, а также при хронических формах заболеваний животных или птиц курс лечения продлевают до 5-7 суток.

Ограничения:

Использование мяса птиц в пищу людям разрешается не ранее чем через 11 суток после последнего применения препарата.

Фасовка:

ЭНРОКОЛИСТИМ выпускают расфасованным:

- по 100, 200 и 400 мл в стеклянные или полимерные флаконы, закупоренные резиновыми пробками, укрепленные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 100 мл упакованы в индивидуальные картонные пачки;
- по 1,0 и 1,5 л в полимерные бутылки, закупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия;
- по 3, 5, 10 л в полимерные канистры, закупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия.



Условия хранения:

Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2°C до 25°C.

Срок годности ЭНРОКОЛИСТИМа при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.



ЭНРОСТИМ 5%

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ



ИМЕЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ,
ОХВАТЫВАЮЩИЙ В Т.Ч. И МИКОПЛАЗМЫ

•

ПРОНИКАЕТ ВО ВСЕ ОРГАНЫ И ТКАНИ
ОРГАНИЗМА

•

ОБЛАДАЕТ БЫСТРОПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
СИЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

ЭНРОСТИМ 5%

Энрофлоксацин основание – 50 мг

Раствор для инъекций. Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия, подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: *E. coli*, *Haemophilus*, *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Pseudomonas*, *Proteus*, *Bordetella*, *Brucella*, *Chlamydia*, *Enterobacter*, *Campylobacter*, *Erysipelothrix*, *Corynebacterium*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Actinobacillus*, *Clostridium*, *Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Salmonella*, а также *Mycoplasma spp.*

Применение:

ЭНРОСТИМ 5% применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам, кошкам и кроликам для лечения органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, септицемии, колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, бактериальной и энзоотической пневмонии, атрофическом рините, синдроме мастит-метрит-агалактии, при смешанных инфекциях, вторичных инфекциях при вирусных болезнях и других заболеваний, вызванных микроорганизмами, чувствительными к фторхинолонам.

ЭНРОСТИМ 5% вводят животным подкожно (кроме свиней), один раз в сутки в течение 3-5 дней, свиньям препарат вводят внутримышечно 1 раз в сутки в течение 3-5 дней, а при лечении мастит-метрит-агалактии свиноматок в течение 1-2 дней.

ЭНРОСТИМ 5% вводят животным в следующих дозах:

- крупный рогатый скот – 1 мл на 20 кг массы животного;
- свиньи – 1 мл на 20 кг массы животного;
- собаки, кошки, кролики – 1 мл на 10 кг массы животного.

Собакам и кошкам при хронических и тяжело протекающих заболеваниях курс применения препарата может быть продлен до 10 дней.

В связи с возможной болевой реакцией препарат не следует вводить в одно место крупным животным в объеме, превышающем 5 мл, и мелким животным в объеме, превышающем 2,5 мл.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота, диарея.

Не рекомендуется применять препарат одновременно с хлорамфениколом, макролидами, теофиллином или с нестероидными противовоспалительными средствами.

Противопоказанием к применению является гиперчувствительность животного к компонентам препарата. Не допускается применение самкам в период беременности и лактации, животным с выраженными нарушениями развития хрящевой ткани, при поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, а также щенкам собак и котят до окончания периода роста.

Ограничения:

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток после последнего применения препарата.

Фасовка:

Стеклянные флаконы по 10, 20, 50, 100, 250 мл, полимерные контейнеры по 250, 500 и 1000 мл.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: в закрытой упаковке при температуре не выше 25°C – 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 28 суток.



ЭНРОСТИМ 10%

ЭНРОФЛОКСАЦИН 10%



РАСТВОРЯЕТСЯ В ЛЮБОЙ ВОДЕ БЕЗ ОСАДКА

•
ВЫСОКАЯ БИОДОСТУПНОСТЬ

•
ЭФФЕКТИВНОСТЬ - 100%

ЭНРОСТИМ 10%

Энрофлоксацин – 100 мг/мл

Для лечения и профилактики сельскохозяйственной птицы, поросят, телят, ягнят при болезнях бактериальной и микоплазмозной этиологии.

Энрофлоксацин обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus hyicus*, *Streptococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium pyogenes*, *Proteus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Brucella canis*, *Actinobacillus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Haemophilus spp.*, *Clostridium perfringens*. ЭНРОСТИМ 10% назначают молодняку крупного и мелкого рогатого скота, поросятам и сельскохозяйственной птице для лечения респираторных, колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза, некротического энтерита, гемофилеза, микоплазмоза, кампилобактериального гепатита, инфекций, вызванных *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus spp.*, а также смешанных инфекций и вторичных инфекций при вирусных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.



Применение:

ЭНРОСТИМ 10% применяют животным орально с водой для поения в течение 3-5 дней в следующих дозах:

Вид животного	Лечебная доза, мг/10 кг живой массы	Лечебная доза, мг/10 л воды
Телята	0,25-0,5	—
Ягнята	0,25-0,5	—
Поросята	0,25-0,5	—
Птица	—	0,5

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно из расчета суточной потребности животных в воде.

При сальмонеллезе препарат применяют в двукратной терапевтической дозе.

В период лечения вода с лекарственным препаратом должна служить единственным источником питья для птиц.

Ограничения:

Использование мяса животных и птиц в пищу людям разрешается не ранее чем через 11 суток после последнего применения препарата.

Фасовка:

Выпускают расфасованными по 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 мл в стеклянные или пластиковые флаконы.

Условия хранения:

Срок годности лекарственного препарата – 2 года с даты производства.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЖИЛЕТ



СДЕЛАН ИЗ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ТКАНИ

•

ИМЕЕТ 9 КАРМАНОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА НИЖНИХ
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ПОЛИМЕРНЫЕ ШЛАНГИ

•

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА



Система для переливания растворов применяется для переливания инфузионных растворов и заменителей крови из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека и животного. В комплект входит: трубка силиконовая медицинская одноканальная 4/7 – 1,5 метра, игла медицинская И-144 – 2 штуки, крючок из нержавеющей стали AISI 304 d3мм – 1 штука.

Применение:

Инфузионная система ООО «БИОСТИМ» применяется для внутривенных вливаний растворов животным. Отличительной чертой инфузионной системы от компании ООО «БИОСТИМ» является использование силикона, который способен выдерживать многократную стерилизацию в автоклаве.

В комплект инфузионной системы входит:

1. Трубка силиконовая медицинская одноканальная 4/7 — 1,5 метра.
2. Игла ветеринарная для взятия крови И — 144 — 2 штуки.
3. Крючок из нержавеющей стали AISI 304 d3мм — 1 штука.

Условия хранения:

Срок годности 5 лет

ПОВАЛ С КОЛЬЦОМ



Повал с кольцом необходим в отдельных случаях при ветеринарных обработках или оказании лечебной помощи, чтобы повалить животное.

В комплект входит:

- кольцо стальное: внутренний диаметр 80мм, толщина кольца 10 мм,
- лента полиэстер белая: ширина 50 мм, длина 7 метров длинный конец/2 метра короткий конец.

Применение:

Повал крупного рогатого скота. Прежде всего надо выбрать участок с мягким грунтом (лучше покрытый травой). Его очищают от камней, проволоки и других предметов. Если на выбранном для повала участке нет растительности, тогда на него насыпают слой опилок, песка, торфа или мха и покрывают его (по возможности) брезентом. На этот участок ставят животное, завязав у основания рогов концы мягкой крепкой веревки длиной 10-12 м сторону.

Сюда же через холку перекидывают и повод уздечки. Для повала становятся со стороны правого бока лошади, ближе к крупу и, взяв в одну руку повод уздечки, а во вторую свободный конец веревки, потягивают одновременно то и другое вниз и назад. Лошадь с поднятой к животу правой задней конечностью не может стоять и падает на правый бок. Как только лошадь легла, ее голову и шею прижимают к земле. Если этого не делают, обвивают ею туловище животного в вертикальном направлении в двух местах: позади лопаток и вокруг живота (впереди вымени у коров). После каждого оборота делают перекрест. Затем 2-3 человека, потягивая за оставшийся свободный конец веревки, заставляют животное постепенно ложиться. Чтобы лежащее животное не встало, ему связывают конечности и удерживают голову, не давая возможности приподнять ее.




ХОРНИСТИМ



ХОРНИСТИМ **паста для обезроживания**

Средство в форме пасты, предназначенное для предупреждения роста рогов у телят и козлят. Паста для обезроживания Хорнистим содержит в своем составе в качестве действующего вещества калия гидроокись (20%), в качестве вспомогательных компонентов - магния оксид (50%), глицерин (20%) и воду.



Применение:

Применение пасты Хорнистим наиболее эффективно в первые дни жизни животного (до 12-ого дня), когда рог новорожденного животного еще не окреп. С целью предотвращения роста рогов выполняются следующие операции, обрабатываемое животное изолируют от матери, далее с рогов бугра удаляют волосяной покров и плоским шпателем наносят тонкий слой пасты диаметром до 30 мм.

Все манипуляции необходимо проводить при отсутствии дождя либо под навесом.

Ограничения:

Обработку проводят с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты: костюм или хлопчатобумажный комбинезон, головной убор, перчатки резиновые. Во время работы с пастой Хорнистим запрещается курить, пить, принимать пищу.

При попадании препарата на кожу необходимо сразу же смыть большим количеством воды **без мыла!!!**

При попадании в желудок необходимо промыть желудок, после чего обратиться к врачу.

В качестве нейтрализатора для пустой упаковки используют 1% раствор лимонной кислоты.

Фасовка:

Пасту для обезроживания Хорнистим выпускают расфасованным по 60 г в полимерные флаконы.

Условия хранения:

Хранят в упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте и источников повышенной влажности при температуре от 0°C до 30°C.





ЛУБРИСТИМ

СУХОЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЛУБРИКАНТ



ЛУБРИСТИМ **сухой концентрированный лубрикант**

Мелкодисперсный порошок-лубрикант в форме концентрата на основе полиэтилен оксида (25%) и диспергента (75%), который при контакте с водой приобретает консистенцию геля.

Применение:

Применение лубриканта Лубристим обеспечивает скольжение, снижает трение и болезненные ощущения у животных при оказании родовспоможения, ректальном и ультразвуковом исследовании, а также искусственном осеменении. Для оказания родовспоможения необходимо растворить небольшое количество концентрата в ёмкости с чистой водой до образования геля желаемой консистенции. Для обработки рук перед ветеринарными манипуляциями (при работе в перчатках) нанесите необходимое количество концентрата на руки и разбавьте водой. Концентрат легко смывается холодной или теплой водой. Поваренная соль быстро удаляет лубрикант и его следы. Препарат безопасен в работе как для животного, так и для человека.

Ограничения:

По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам порошка следует избегать прямого контакта с лубрикантом. При случайном контакте препарата и слизистых оболочек глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. При случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Фасовка:

Препарат выпускают в флаконах по 40 и 80 г.

Условия хранения:

Хранят препарат в сухом месте при температуре 5 °С - 35°С, избегая попадания воды, прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей.



КОРМОВЫЕ АНТИБИОТИКИ

торговой марки "БИОВИТЕКС"



Термостабильные препараты в форме микрогранулированных порошков для перорального применения

АМОКСИСТИМ К

Действующее вещество:
амоксциллин - 150 мг или 200 мг

ТИАСТИМ К

Действующее вещество:
тиамулин - 100 мг

ДОКСИСТИМ К

Действующее вещество:
доксциклина гиклат - 100 мг, 150 мг или 200 мг

ФЛОРИСТИМ К

Действующее вещество:
флорфеникол - 40 мг, 100 мг или 200 мг

КОЛИСТИМ К

Действующее вещество:
колистин - 50 мг, 100 мг или 150 мг

ЭНРОСТИМ К

Действующее вещество:
энрофлоксацин - 100 мг

- ✓ Повышение эффективности дозирования антибиотиков
- ✓ Сокращение затрат на антибиотикотерапию на фермах

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

АМОКСИСТИМ 15% К, АМОКСИСТИМ 20% К

ДВ - Амоксициллина тригидрат

Лекарственная форма: порошок микрогранулированный для перорального применения.

АМОКСИСТИМ К содержит в 1 г в качестве действующего вещества: амоксициллин (в форме тригидрата) – 150 мг или 200 мг и вспомогательные вещества: мука древесная, глицерина моностеарат, кислота пропионовая и масло вазелиновое.

Фармакологические свойства:

АМОКСИСТИМ К относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы полусинтетических антибиотиков пенициллинового ряда. Механизм бактерицидного действия входящего в состав препарата амоксициллина тригидрата заключается в подавлении активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов - пептидогликана, что приводит к гибели бактерий. Антибиотик активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Порядок применения:

АМОКСИСТИМ К назначают свиньям с лечебной и лечебно-профилактической целью при острых и хронических заболеваниях респираторного и желудочно-кишечного трактов, а также других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является гиперчувствительность животного к б-лактамным антибиотикам и выраженные нарушения функции почек. АМОКСИСТИМ К применяют свиньям с кормом индивидуально или способом группового скармливания в суточной дозе 10-15 мг амоксициллина тригидрата на 1 кг массы животного, что эквивалентно 0,67-1,00 г АМОКСИСТИМ К 15% / 0,50-0,75 г АМОКСИСТИМ К 20% на 10 кг массы тела, в течение 5-10 дней.

Особенности действия:

При первом применении и при отмене лекарственного препарата не установлено. АМОКСИСТИМ К по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 15 суток после последнего применения препарата АМОКСИСТИМ К. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Фасовка: по 10 кг, 20 кг и 25 кг в мешках из многослойной бумаги с внутренним слоем из полиэтилена; по 2 кг и 5 кг в полимерных банках, укупоренных крышками. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

Хранение: в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C. Допускается транспортировка при отрицательных температурах. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 3 года со дня производства. После первого вскрытия упаковки лекарственный препарат необходимо использовать в течение 6 месяцев. Срок годности смеси корма и лекарственного препарата — 3 месяца. Не применять по истечении срока годности.

ДОКСИСТИМ 10% К, ДОКСИСТИМ 15% К, ДОКСИСТИМ 20% К

ДВ - Доксидоцилина гиклат

Лекарственная форма: порошок микрогранулированный для перорального применения. ДОКСИСТИМ К содержит в 1 г препарата в качестве действующего вещества доксициклин (в форме доксициклина гиклата) – 100мг, 150 мг или 200мг; в качестве вспомогательных веществ: глицерина моностеарат, кислоту пропионовую, масло вазелиновое и муку древесную.

Фармакологические свойства: Антибактериальный лекарственный препарат группы тетрациклинов. Доксициклинагиклат, входящий в состав препарата, является антибиотиком тетрациклиновой группы и обладает широким спектром действия в отношении аэробных грамположительных бактерий *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Listeria* spp., аэробных грамотрицательных, таких как *Bacteroides* spp., а также анаэробных бактерий *Clostridium* spp. Доксициклин активен также в отношении аэробных грамотрицательных бактерий: *Bordetella* spp., *Escherichia coli*, *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp, в т.ч. *Pasteurella multocida*, *Salmonella* spp., *Chlamydia* spp., *Rickettsia* spp., *Mycoplasma* spp, *Klebsiella* spp., *Treponema* spp., и *Enterobacter* spp. Механизм действия доксициклина основан на угнетении активности ферментов, катализирующих связывание аминокетил-РНК с рибосомальными акцепторами, что нарушает синтеза белка на рибосомальном уровне. Это останавливает размножение бактерий и производит бактериостатический эффект.

Порядок применения: назначают поросятам и взрослым свиньям, сельскохозяйственной птице, ремонтному молодняку кур до 16 недельного возраста и бройлерам с лечебной целью при хронических респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, в том числе микоплазмозе, колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, стафилококкозе и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину. Для обеспечения равномерного распределения лекарственного препарата ДОКСИСТИМ К в корме, рассчитанную дозу ступенчато смешивают с комбикормом и дают свиньям в течение 5-7 дней.

Особенности действия: ДОКСИСТИМ К по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными не обладает гепатотоксическим, эмбриотоксическим и тератогенным свойствами.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность животного к тетрациклиновым антибиотикам и другим компонентам препарата. Не следует применять препарат животным с выраженными нарушениями функции печени и почек. Запрещается применение Доксицим К племенным животным и птице, а также ремонтному молодняку кур с 16 недельного возраста, в связи с накоплением доксициклина в яйцах.

Фасовка: по 10 кг, 20 кг и 25 кг в мешках из многослойной бумаги с внутренним слоем из полиэтилена; по 2 кг и 5 кг в полимерных банках, укупоренных навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

Хранение: В закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30 °C. Допускается кратковременное (до 10 суток) транспортирование при температуре до минус 20 °C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки – 6 месяцев при соблюдении условий хранения – при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 50%; в готовой смеси с кормом – 2 месяца. Не применять по истечении срока годности.

КОЛИСТИМ 5% К, КОЛИСТИМ 10% К, КОЛИСТИМ 15% К

ДВ - Колистина сульфат

Лекарственная форма: гранулы для перорального применения.

КОЛИСТИМ К содержит в 1 г препарата в качестве действующего вещества колистин (в форме колистина сульфата) – 50 мг, 100 мг или 150 мг, а в качестве вспомогательных веществ: глицерина моностеарат, кислоту пропионовую, масло вазелиновое и муку древесную.

Фармакологические свойства:

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальный лекарственный препарат группы полипептидных

антибиотиков. Колистина сульфат, входящий в состав препарата активен в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов, в том числе: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Aerobacter aerogenes*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.* и *Pasteurella spp.*

Механизм бактерицидного действия колистина заключается в его соединении с липопротейнами бактерий и нарушении проницаемости клеточной стенки, что приводит к потере бактериальной клеткой аминокислот, неорганических ионов, пуринов, пиримидинов и вызывает ее гибель.

Порядок применения: КОЛИСТИМ К назначают свиньям и сельскохозяйственной птице с лечебной и лечебно-профилактической целью при сальмонеллезе, колибактериозе и других желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к колистину.

Вид животного	Суточная доза по колистину сульфату	Концентрация колистина сульфата на 1 г КОЛИСТИМ К		
		50 мг	100 мг	150 мг
свиньи	100 000 МЕ/кг массы тела	0,08 г КОЛИСТИМ К на 1 кг массы тела	0,04 г КОЛИСТИМ К на 1 кг массы тела	0,03 г КОЛИСТИМ К на 1 кг массы тела
сельскохозяйственная птица	75 000 МЕ/кг массы тела	0,06 г КОЛИСТИМ К на 1 кг массы тела	0,03 г КОЛИСТИМ К на 1 кг массы тела	0,02 г КОЛИСТИМ К на 1 кг массы тела

Особенности действия:

КОЛИСТИМ К не следует применять совместно с пероральными препаратами кальция, магния; препаратами,

содержащими ненасыщенные жирные кислоты; антибактериальными препаратами из групп: тетрациклинов, макролидов, аминогликозидов и цефалоспоринов, ввиду возможного снижения антибактериальной активности.

Фасовка:

по 10 кг, 20 кг и 25 кг в мешках из многослойной бумаги с внутренним слоем из полиэтилена;

по 2 кг и 5 кг в полимерных банках, укупоренных навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия.

Хранение:

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C. Допускается кратковременное (до 10 суток) транспортирование при температуре до минус 20°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки – 6 месяцев, при соблюдении условий хранения – при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 50%; в готовой смеси с кормом – 2 месяца. Не применять по истечении срока годности.

ТИАСТИМ 10% К

ДВ - Тиамулина гидроген фумарат

Лекарственная форма: порошок микрогранулированный для перорального применения.

ТИАСТИМ 10% К содержит в 1 г препарата в качестве действующего вещества тиамулин (в форме тиамулина гидроген фумарата) — 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ: глицерина моностеарат, кислоту пропионовую, масло вазелиновое и муку древесную.

Фармакологические свойства: Препарат ТИАСТИМ 10% К относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы дитерпеновых антибиотиков. Тиамулина гидроген фумарат, входящий в состав лекарственного препарата, является полусинтетическим антибиотиком группы плевромугилинов, обладает бактериостатической активностью, подавляя синтез белка микробной клетки на рибосомальном уровне, и проявляет высокую активность в отношении микоплазм, спирохет, грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных микроорганизмов.

Порядок применения: ТИАСТИМ 10% К назначают свиньям с лечебной целью при пролиферативной энтеропатии, дизентерии, актинобациллярной плевропневмонии, энзоотической пневмонии, кишечном спирохетозе и при других инфекциях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.

Применение: Препарат ТИАСТИМ 10% К применяют перорально в смеси с кормом, индивидуально или групповым способом в следующих суточных дозах: при дизентерии в дозе 1,0 кг на тонну корма (5 мг тиамулина на кг массы животного) в течение 3-5 дней. при респираторных заболеваниях (энзоотическая пневмония, плевропневмония) в дозе 2,0 кг на тонну корма (10 мг тиамулина на кг массы животного) в течение 10 суток, при спирохетозе в дозе 1,0 кг на тонну корма (5 мг тиамулина на кг массы животного) в течение 7-10 суток. при илеите в дозе 1,0-1,5 кг на тонну корма (5-7,5 мг тиамулина на кг массы животного) в течение 14 суток.

Особенности действия: ТИАСТИМ 10% К не следует применять совместно с салиномицином, наразиним, монензином и другими полиэфирными ионофорами, антибиотиками аминогликозидной группы, а также в течение 7 дней до и после их применения, вследствие возможного усиления токсического эффекта.

Фасовка:

по 10 кг, 20 кг и 25 кг в мешках из многослойной бумаги с внутренним слоем из полиэтилена; по 2 кг и 5 кг в полимерных банках, укупоренных крышками с контролем первого вскрытия. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

Хранение:

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до +25. Допускается кратковременное (до 10 суток) транспортирование при температуре до -20. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке — 2 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки — 6 месяцев, в готовой смеси с кормом — 2 месяца.

ФЛОРИСТИМ 4% К, ФЛОРИСТИМ 10% К, ФЛОРИСТИМ 20% К

ДВ - Флорфеникол

Лекарственная форма: порошок микрогранулированный для перорального применения. ФЛОРИСТИМ К содержит в 1 г препарата в качестве действующего вещества флорфеникол — 40 мг, 100 мг или 200 мг, а в качестве вспомогательных веществ: глицерина моностеарат, кислоту пропионовую, масло вазелиновое и муку древесную.

Фармакологические свойства:

ФЛОРИСТИМ К относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы фениколов. Флорфеникол, входящий в состав препарата обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе в отношении бактерий, которые синтезируют ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу. Механизм бактериостатического действия заключается в ингибировании синтеза белка путем обратимого связывания с 50S рибосомальными субъединицами восприимчивых бактерий, что приводит к ингибированию пептидилтрансферазы и тем самым предотвращает перенос аминокислот в растущие пептидные цепи и последующее образование белка.

Порядок применения:

ФЛОРИСТИМ К назначают свиньям с лечебной и лечебно-профилактической целью при плевропневмонии, вызванной *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, атрофическом рините, вызванном *Pasteurella multocida* и *Bordetella bronchiseptica*, а также других инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

Препарат ФЛОРИСТИМ К применяют перорально в смеси с кормом, индивидуально или групповым способом в суточной дозе 5-10 мг флорфеникола на 1 кг массы животного, что эквивалентно 125-250 мг ФЛОРИСТИМ 4% К / 50-100 мг; ФЛОРИСТИМ 10% К / 25-50 мг; ФЛОРИСТИМ 20% К / на 1 кг массы животного. Нормы ввода лекарственного препарата ФЛОРИСТИМ К составляет: 2,5-5 кг ФЛОРИСТИМ 4% К на тонну корма; 1-2 кг ФЛОРИСТИМ 10% К на тонну корма; 0,5-1 кг ФЛОРИСТИМ 20% К на тонну корма.

Особенности действия:

Не допускается применять ФЛОРИСТИМ К одновременно с тиамфениколом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, цефалоспорины и фторхинолоны, непрямыми антикоагулянтами, барбитуратами, миорелаксантами.

Фасовка:

по 10 кг, 20 кг и 25 кг в мешках из многослойной бумаги с внутренним слоем из полиэтилена;

по 2 кг и 5 кг в полимерных банках, укупоренных навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия.

Хранение: Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до +30. Допускается кратковременное (до 10 суток) транспортирование при температуре до -20 С.

Срок годности: лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке — 4 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки лекарственный препарат необходимо использовать в течение 6 месяцев. Срок годности смеси корма и лекарственного препарата — 3 месяца. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

ЭНРОСТИМ 10% К

ДВ - Энрофлоксацин

Лекарственная форма: микрокапсулированный порошок для орального применения. ЭНРОСТИМ 10% К в качестве действующего вещества в 1 г содержит 100 мг энрофлоксацина; в качестве вспомогательных веществ: древесную муку, глицерина моногидрат, пропионовую кислоту, вазелиновое масло и вкусоароматическую добавку.

Фармакологические свойства:

ЭНРОСТИМ 10% К относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы фторхинолонов.

Энрофлоксацин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамотрицательных и многих грамположительных аэробных и анаэробных микроорганизмов.

Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гиразы (топоизомеразы типа II), обеспечивающего репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки, что приводит к гибели микроорганизма. Энрофлоксацин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает во все органы и ткани животных. Максимальная концентрация энрофлоксацина в плазме крови достигается через 1-2 часа после применения лекарственного препарата, терапевтическая концентрация сохраняется на протяжении 24 часов. Энрофлоксацин частично метаболизируется в печени с образованием активного метаболита ципрофлоксацина, также обладающего антибактериальной активностью. Из организма энрофлоксацин и его метаболиты выводятся в основном с мочой и желчью.

Порядок применения:

Препарат ЭНРОСТИМ 10% К применяют свиньям и сельскохозяйственным птицам с лечебной и лечебно-профилактической целью острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и респираторных органов, вызванных бактериями, чувствительными к энрофлоксацину. Сельскохозяйственным птицам при колибактериозе, сальмонеллезе, некротическом энтерите, стрептококкозе, микоплазмозе; свиньям – при сальмонеллезе, пастереллезе, бактериальной и энзоотической пневмонии, колисептицемии, атрофическом рините и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

Дозировка: ЭНРОСТИМ 10% К применяют перорально индивидуально или групповым способом в суточной дозе:

Свиньям – 2,5 мг энрофлоксацина на кг массы животного, что соответствует 0,25 г ЭНРОСТИМ 10% К на 10 кг живой массы в течение 3-х дней; при сальмонеллезе и в тяжелых случаях течения заболевания назначают 5 мг энрофлоксацина на 10 кг живой массы, что соответствует 0,50 г препарата ЭНРОСТИМ 10% К на 10 кг животного в течении 5 дней.

Особенности действия:

При применении лекарственного препарата ЭНРОСТИМ 10% К в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к препарату и проявлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Фасовка: по 10, 20 и 25 кг в мешки из многослойной бумаги с внутренним полиэтиленовым пакетом; по 2 кг и 5 кг в банки ПЭТ с закручивающейся крышкой.

Хранение:

Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 30°C. Допускается транспортировка при отрицательных температурах.

Срок годности: лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки – 90 дней при температуре не выше 300С. Срок годности приготовленного лечебного корма – 3 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

Совместимость различных групп антибиотиков

БИОВЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	Пенициллины	Цефалоспорины	Эритромицин	Тетрациклины	Левомецетин	Стрептомицин	Мономицин	Канамицин	Гентамицин	Линкомицин	Ристомидин	Сульфаниламиды	Бисептол	Фурагин	Невиграмон	Диоксидин
	++	++	—	—	—	++	++	++	++	—	—	+	++	+	++	++
Пенициллины	++	—	—	++	++	+	—	++	++	—	—	+	++	+	++	++
Цефалоспорины	++	++	—	++	++	+	—	++	++	—	—	+	++	+	++	++
Эритромицин	—	—	++	++	++	+	—	++	++	+	—	++	++	++	++	+
Тетрациклины	—	—	++	++	++	+	—	++	++	+	—	++	++	++	++	++
Левомецетин	—	—	++	++	++	+	—	++	++	+	—	++	++	++	++	++
Стрептомицин	++	++	—	+	—	++	—	++	++	—	—	++	++	++	++	++
Мономицин	++	++	—	+	—	++	—	++	++	—	—	++	++	++	++	++
Канамицин	++	++	—	+	—	++	—	++	++	—	—	++	++	++	++	++
Гентамицин	++	++	—	+	—	++	—	++	++	—	—	++	++	++	++	++
Линкомицин	—	—	+	++	++	+	+	+	—	—	—	++	+	++	+	+
Ристомидин	—	—	+	+	—	—	+	+	+	—	—	++	++	++	++	++
Сульфаниламиды	+	+	++	++	++	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	++
Бисептол	++	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Фурагин	+	+	++	++	++	+	+	+	++	++	++	++	++	++	++	++
Невиграмон	+	+	++	++	++	+	+	+	++	++	++	++	++	++	++	++
Диоксидин	++	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++

"++" - усиление действия, "+" - слабое усиление действия, "—" - ослабление действия, "•" - усиление токсичности
При комбинации пенициллинов разного спектра действия эффект каждого из них усиливается.

Завод ООО «БИОСТИМ»



ООО "БИОСТИМ" - Предприятие по производству ветеринарных препаратов, основано в 2011 г. в г. Боброве, Воронежская область.

Создание культовых аналогов импортных препаратов в эксклюзивной фасовке

Занимаются разработкой формул собственной линейки препаратов под торговой маркой "БИОВИТЕКС"



биовитекс



ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ООО «БИОВЕТ»

г. Москва, ул. Б.Косинская 27 офис 301
тел. (495) 150-08-74, e-mail: biovet@bk.ru
сайт: био-вет.рф

